


**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN MANAGUA  
HOSPITAL BERTHA CALDERÓN ROQUE.**



**TESIS MONOGRÁFICA PARA OPTAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN  
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA**

**USO DE ANTICONCEPTIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO  
SUBSECUENTE EN ADOLESCENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL  
BERTHA CALDERON ROQUE DURANTE EL AÑO 2014.**

**AUTOR:**

Dra. Leticia Leonor Cisnero Cerda.

Residente de IV año de Ginecoobstetricia.

**TUTOR:**

Dr. Carlos Dinarte.

Especialista en Ginecología Infantojuvenil

Máster en Salud Pública

**. ASESOR:**

Dr. Steven Cuadra, MD., Msc., LicMed., PhD.

**Febrero 2016**

## DEDICATORIA

*Quiero dedicarle este trabajo*

*A Dios Padre todopoderoso creador del cielo y la tierra, él es el pilar fundamental de nuestra causa existencial, somos consecuencia de DIOS, el quien me ha dado la vida, fortaleza, perseverancia para terminar este proyecto y está entre nosotros es por ello que le doy infinitas gracias.*

*A mi madrecita por estar ahí cuando más los necesité; por su ayuda invaluable y constante cooperación.*

*A mis hijos Eleazar Rodolfo, Mijaíl Alejandro por acompañarme, esperarme pacientemente cuando estuve ausente y tolerarme en los momentos más difíciles.*

*A mi esposo por ser mi apoyo en todo momento.*

*A todas las pacientes adolescentes que brindaron parte de su tiempo para la realización de este proyecto.*

## **AGRADECIMIENTOS**

Se expresa el agradecimiento a:

A todas y cada una de las personas que colaboraron para la realización de este estudio:

Al departamento de estadística y archivo.

Al Dr. Serge Amador, Dr. Leiva, a Dra. Juárez, a Lic. Rosa Julia.

Agradezco especialmente a mi tutor Dr. Carlos Dinarte por su valioso tiempo brindado.

## OPINIÓN DEL TUTOR

Siendo nuestra sociedad vulnerable , falta de un nivel cultural que forje los conocimientos esenciales a nuestros adolescentes , que enseñe sobre los riesgos que corren ,donde la opinión no va mas allá de ver las necesidades básicas de alimentación, educación, donde predomina el conformismo , donde no se lucha por los sueños, los ideales , donde se enseña a estigmatizar y culpar a los adolescentes de los errores de los padres , la sociedad , la familia y él conglomerado social . Por ser nosotros quienes interactuamos con todas y cada una de las patologías medicas que derivan en; enfermedad, desnutrición , pobreza y muerte , por conocer a fondo nuestras carencias sociales el sentir de la población en uno de los extremos tan importantes de la vida, ya que de los adolescentes depende el futuro y porvenir de la población, es que necesitamos educar , corregir , ayudar y brindar la herramienta fundamental en el área preventiva y educativa así como de consejería de salud sexual y reproductiva , enseñando sobre los métodos de anticoncepción y su uso adecuado para así disminuir la frecuencia de embarazos no deseados , abortos provocados , así como los nacimientos bajo peso , pre términos, muertes fetales y muertes maternas secundarias a la falta de información y consejería.

Por todo lo anteriormente expuesto considero esta será una pieza importante para el devenir de futuros estudios en pro de mejorar la información, estrategias a tomar en consideración para mejorar la atención de nuestra población adolescente y mejorar su calidad de vida.

## **RESUMEN**

Con el objetivo de conocer el uso de anticonceptivos para la prevención del embarazo subsecuente en adolescentes cuyo parto o cesárea fue atendido en el Hospital Bertha Calderón Roque, durante el año 2014, se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, longitudinal, retrospectivo. Se estudiaron 159 adolescentes a través de la revisión de su expediente clínico para identificar el anticonceptivo prescrito al alta hospitalaria y a través de entrevistas (cara a cara o vía telefónica) para conocer el uso posterior de anticonceptivo y la ocurrencia de un embarazo. Entre los principales resultados se encontró que la tasa de anticonceptivo prescrito al alta fue del 85.5%, y la tasa de persistencia de uso del anticonceptivo prescrito fue de 25%. La tasa de prevención del embarazo subsecuente en este grupo de pacientes fue de 94.8%. El tipo de anticonceptivo prescrito con mayor frecuencia en las adolescentes fue el inyectable trimestral, el cual es categoría III según los criterios de elegibilidad de la OMS.