



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA CENTRO DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA,
MAESTRÍA ENSALUD PÚBLICA ELSALVADOR 2011-2013**



TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

“FACTORES ASOCIADOS AL USO DE CONDÓN, PERSPECTIVAS DE FUTURO Y LA
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR
LA CALIDAD VIDA DE LAS PERSONAS CON VIH DE GUATEMALA, AÑO 2012”

Autor:

Otoniel Ramírez Hernández

Asesor:

Dr. Alejandro Sánchez

San Salvador, Abril de 2013

i. Dedicatoria

Dedico este estudio, principalmente a Dios, a mi madre que en paz descanse, a todas las personas que creyeron en mí, dándome ejemplos dignos de superación y entrega, porque en gran parte gracias a ustedes, hoy puedo ver alcanzada mi meta, ya que siempre estuvieron impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, y porque el orgullo y afecto que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final.

Va por ustedes, por lo que valen, porque admiro su fortaleza y por lo que han hecho de mí.

A mi pareja y amigos-as, maestros-as, a mis compañeros-as de maestría, gracias por haber impulsado en mí el deseo de superación y anhelo de triunfo en la vida. Mil palabras no bastarían para agradecerles su apoyo, su comprensión y sus consejos en los momentos difíciles

A todos-as, espero no defraudarlos-as y contar siempre con su valioso apoyo, sincero e incondicional.

“Los cambios exteriores siempre comienzan con un cambio interior de actitud.” (Albert Einstein)

ii. Agradecimiento

La presente Tesis es un esfuerzo en el cual, directa o indirectamente, participaron muchas personas leyendo, opinando, corrigiéndome, teniéndome paciencia, dándome ánimo, acompañándome en los momentos de crisis y en los momentos de felicidad.

Agradezco a las personas con VIH de Guatemala por haber colaborado en este proceso académico. Gracias también a mis queridos-as maestros-as, que me apoyaron y me permitieron entrar en su vida durante estos dos años de convivir dentro y fuera del aula de clase.

Al Programa Regional REDCA+, que no sólo financió mis estudios de maestría, sino que además me facilitó la base de “Perfil de Riesgos de las personas con VIH de Guatemala” contenida en el “Perfil de Riesgos de las personas con VIH de Centroamérica”

Gracias a todos-as.

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	RESUMEN.....	5
III.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	6
	PREGUNTA DE LA INVESTIGACION.....	6
IV.	JUSTIFICACIÓN.....	7
V.	LIMITACIONES.....	8
VI.	OBJETIVOS.....	9
	OBJETIVO GENERAL.....	9
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
VII.	MARCO REFERENCIAL.....	10
VIII.	DISEÑO METODOLOGICO.....	17
	A. TIPO DE ESTUDIO.....	17
	B. POBLACIÓN DE ESTUDIO	17
	ii. Muestra	18
	iii. Muestreo	19
	iv. Criterios de inclusión y exclusión.....	20
	MATERIAL Y MÉTODOS	21
	Procedimiento de selección de los individuos encuestados.....	21
	C. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	22
	D. SEGUNDA FASE: ANÁLISIS BIVARIADO.....	23
	E. TERCERA FASE: ANÁLISIS MULTIVARIADO	23
IX.	RESULTADOS.....	24
	Características sociodemográficas:	24
	Perspectivas de Futuro.....	25
	Uso del Condón	25
	Adherencia al Tratamiento.....	26
	1. Antecedentes Sociodemográficos.....	26
	2. Perspectivas de Futuro.....	34
	3. Uso del Condón	39

4. Adherencia al Tratamiento	42
X. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	45
XI. CONCLUSIONES.....	50
XII. RECOMENDACIONES.....	52
ANEXOS.....	54
XIII. BIBLIOGRAFÍA.....	53

I. INTRODUCCIÓN.

A más de dos décadas de haber iniciado la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana y VIH Avanzado, antes conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida es decir a la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos, muchas son las estrategias que se han implementado a nivel mundial para hacerle frente.

El presente trabajo “Factores asociados al uso de condón, perspectivas de futuro y la adherencia al tratamiento antirretroviral que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH de Guatemala, año 2012” tiene por objetivo Identificar estos los elementos y su vinculación con la mejora en la calidad de vida de las personas con VIH.

El concepto de calidad de vida es global, multidisciplinar e implica aspectos objetivos y subjetivos. La calidad de vida relacionada con la salud involucra el funcionamiento y los síntomas físicos, los factores psicológicos y los aspectos sociales. Existe un gran interés por el estudio de la calidad de vida en la población de personas con VIH o VIH avanzado y las investigaciones han mostrado que existe una relación entre la calidad de vida y variables uso del condón, perspectivas de futuro y la adherencia al tratamiento antirretroviral. Algunos factores que se han encontrado asociados con la calidad de vida relacionada con la salud en personas con VIH o VIH avanzado son la fase de la infección en la que se encuentre la persona con VIH, los parámetros biológicos en el VIH, como los niveles de linfocitos CD4 y de carga viral. Es muy importante la puesta en marcha de intervenciones eficaces que estén orientadas a mejorar la calidad de vida de los personas con VIH o VIH Avanzado a lo largo de todo el período evolutivo de la infección.

El análisis se realizará con la información recolectada por las encuestas que se administraron a personas con VIH o con VIH avanzado que asisten a las Unidades de Atención Integral (UAI) o a los Grupos de Apoyo de organizaciones y, que reciben atención en los servicios de Salud de Guatemala.

El instrumento está dividido en trece secciones, con un total de 207 preguntas, para el caso de nuestro objeto de estudio se prevé obtener información relacionada a los aspectos sociodemográficos; participación en grupos de apoyo y perspectiva de vida; comportamiento sexual; condones; relaciones sexuales con parejas estables; relaciones sexuales con parejas ocasionales y última relación sexual lo cual será fundamental para demostrar con base a evidencia que se debe implementar intervenciones más efectivas y eficaces para que las personas adopten estilos de vida más saludables y por ende extiendan su cantidad y calidad de vida.

II. RESUMEN

En el documento se presentan los resultados de los “Factores asociados al uso de condón, perspectivas de futuro y la adherencia al tratamiento antirretroviral que contribuyen a mejorar la calidad vida de las personas con VIH de Guatemala, año 2012”. El análisis se realizó con información generada por el cuestionario proporcionado por la Red Centroamericana de Personas con VIH, del “Perfil de Riesgo de Personas con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+” 2012.

La población que incluyó el cuestionario corresponde a personas con VIH atendidas en las Unidades de Atención Integral (UAI) de Guatemala. La encuesta está diseñada como una muestra por conglomerados es decir una selección representativa de las Unidades de Atención Integral y no como una muestra aleatoria simple.

Se realizaron análisis bivariados para identificar factores asociados a uso consistente del condón y adherencia a tratamiento antirretroviral y percepción de vida a futuro.

En general, la población refiere que identifica ampliamente el uso del condón como método de prevención para el VIH y además con su uso pueden contribuir en algo para detener la epidemia no obstante, el uso consistente del mismo es bajo, en relación a la adherencia a la TAR en general se reportó una auto adherencia de 83% lo cual indica que las personas se apegan a las indicaciones proporcionadas por los-as médicos-as tratantes.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El VIH y VIH Avanzado se ha convertido, desde la aparición de los primeros casos a principios de los ochenta, en uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. A pesar de los resultados prometedores con los fármacos en el tratamiento antirretroviral de las personas con VIH, no es probable que al momento una vacuna u otro tratamiento definitivamente efectivo alcance la cura de esta infección y que esté disponible en un futuro próximo.

La política de prevención con mucha frecuencia tiene una base de opinión generalista más que científica, y por ello se necesita un mejor conocimiento de las características de las personas afectadas para valorar los mejores programas y políticas de prevención, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada área y su evolución en el tiempo.

PREGUNTA DE LA INVESTIGACION

¿Existe una relación entre calidad de vida, el uso del condón y la adherencia al tratamiento antirretroviral y perspectivas de futuro de las personas con VIH de Guatemala?

IV.JUSTIFICACIÓN.

Con la presente investigación se obtendrá información sobre los factores asociados al uso de condón, perspectivas de futuro y la adherencia al tratamiento antirretroviral de las personas con VIH de Guatemala y su relación con la calidad de vida, la información analizada servirá de base para elaborar otros estudios a personas con VIH, en donde se tendrá referencia del mismo y se podrá evaluar la influencia de estos factores que contribuyen a mejorar la calidad y cantidad de vida de las Personas con VIH. La acción social contribuirá a mejorar la dinámica de prevención secundaria del VIH, a su vez la autoadherencia a la terapia antirretroviral para mantener su salud, la necesidad del uso consistente y continuo del condón y sus perspectivas a futuro, son fundamentales para tener proyectos de vida a futuro. Es importante tomar en cuenta que la mayoría de los estudios publicados se refieren a la descripción de las personas con VIH con datos que se obtienen del Registro Nacional de los Programas de VIH, siendo pocos los estudios que describen las características de las personas. En último lugar, se espera que incida políticamente para la planeación, implementación y evaluación de los programas de prevención primaria, secundaria y terciaria del VIH-en Guatemala.

V. LIMITACIONES.

Las personas con VIH con menor nivel académico presentan menos proyecciones a futuro que aquellas personas que tienen un mayor grado académico y por ende la información que suministran es menos objetiva.

La percepción que tienen las personas con VIH de su relación familiar, influye sobre su estado emocional y cuando perciben una situación de indiferencia, es cuando más consecuencias negativas se tienen y por ende pueden responder dependiendo de su estado anímico

El limitado tiempo de la investigación, representó la principal limitante para realizar este estudio.

La carencia de indicadores mesurables para calcular el impacto de los factores que influyen en uso de condón, perspectivas de futuro y la adherencia al tratamiento antirretroviral de las personas, fue un obstáculo real para determinar su efectividad.

VI.OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores asociados al uso de condón y la adherencia al tratamiento antirretroviral, de las personas con VIH de Guatemala, con el fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las características sociodemográficas de las personas con VIH, mayores de 18 años.

Determinar la prevalencia de reporte de uso de condón en personas con VIH mayores de 18 años de Guatemala, relacionadas a las características asociadas a su uso.

Conocer la prevalencia de adherencia a la terapia antirretroviral de las personas con VIH mayores de 18 años de Guatemala, relacionadas a las características asociadas a factores de adherencia.

Describir las perspectivas de futuro de las personas con VIH de Guatemala, asociadas a calidad de vida.

VII. MARCO REFERENCIAL

En América Central, los sistemas deficientes de vigilancia epidemiológica del VIH obstaculizan una comprensión actualizada de las epidemias en esta subregión. La información disponible señala epidemias que se asocian principalmente a la transmisión del VIH durante relaciones sexuales no protegidas entre hombres y relaciones sexuales remuneradas, y la migración es un factor importante en la propagación del virus.

En un contexto de homofobia generalizada, se están produciendo epidemias ocultas de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en varios países centroamericanos, incluidos Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. En comparación con la prevalencia del VIH en la población adulta general, los niveles de infección en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres eran siete veces mayores en Honduras, 10 veces mayores en Guatemala y Panamá, 22 veces mayores en El Salvador y 38 veces mayores en Nicaragua. En un estudio de cinco países realizado en 2002, resultaron VIH positivos casi uno de cada seis (15%) hombres en El Salvador y uno de cada ocho (12%) en Guatemala y Honduras. Las prevalencias más bajas constatadas fueron del 8% en Nicaragua y 9% en Panamá. Los niveles relativamente altos de conocimiento de métodos de prevención del VIH (que iban del 79% en El Salvador al 96% en Honduras) se contradecían en parte con la gran proporción de hombres (entre una cuarta parte en Honduras y la mitad en Nicaragua) que albergaba conceptos erróneos acerca de la transmisión del VIH.

Las relaciones sexuales seguras eran infrecuentes en Guatemala y Nicaragua, donde más de la mitad de los hombres dijeron que no habían utilizado sistemáticamente condones con parejas masculinas esporádicas durante el mes anterior al estudio. En Nicaragua, casi la mitad de los profesionales masculinos del

sexo encuestados no habían utilizado sistemáticamente preservativos durante el último mes.

El mismo estudio encontró niveles elevados de prevalencia del VIH entre profesionales femeninas del sexo en Honduras (10%), Guatemala (4%) y El Salvador (3%), junto con una baja prevalencia del 0,2% en Nicaragua y Panamá. Dado que casi la mitad de las profesionales femeninas del sexo en Nicaragua dijeron que no habían utilizado preservativos de forma constante con clientes nuevos o habituales durante el último mes, este país deberá incrementar los esfuerzos de prevención del VIH dirigidos a las/os profesionales del sexo. Las notables disparidades en la prevalencia de otras infecciones de transmisión sexual también subrayan la necesidad de mejorar los servicios básicos de salud sexual en países como El Salvador (donde el 15% de las profesionales femeninas del sexo estaban infectadas por sífilis y el 11% por blenorragia), Guatemala (prevalencia del 12% de sífilis y 11% de blenorragia) y Nicaragua (prevalencia del 8% de sífilis y 9% de blenorragia).

Por otra parte en relación a la terapia antirretroviral América Latina y el Caribe tienen las cifras más altas de cobertura de TAR siendo las regiones con mas desarrollo del mundo: se estima que un 63% de las personas con VIH que necesitan tratamiento lo están recibiendo.

Sin embargo, un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud- Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) señala que preservar el liderazgo de la región en brindar tratamientos antirretrovirales requiere superar problemas en los sistemas nacionales de salud que van desde desabastecimiento de medicamentos hasta falta de estudios de costo-efectividad en el uso de los esquemas antirretrovirales.

El informe “Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de salud pública en Latinoamérica y el Caribe” analiza las vulnerabilidades de los programas de TAR en América Latina y el Caribe, y hace recomendaciones para reforzar los sistemas

de salud en los países para que se asegure la sostenibilidad de estos programas y el progreso hacia el acceso universal al tratamiento antirretroviral.

El informe evalúa datos sobre los patrones en precios de los tratamientos antirretrovirales, adquisiciones y consumo; en co-infecciones de VIH-tuberculosis; y sobre la dependencia del financiamiento externo, entre otros puntos. Es importante destacar que la mayoría de las personas con VIH o VIH avanzado que reciben TAR en América Latina y el Caribe están recibiendo ARV seguros y efectivos.

Sin embargo, el informe señala una serie de desafíos en asegurar la efectividad y eficiencia en el uso de ARV. Un pequeño porcentaje de personas con VIH, un 5% de las personas están en la primera línea de terapia y un 14% en la segunda línea de terapia, muchas de las cuales están tomando combinaciones inapropiadas, según este estudio.

Un problema más generalizado es la ineficiencia: la media de tratamientos antirretrovirales de primera línea en cada país de América Latina y el Caribe es de 12 esquemas diferentes, en tanto para los tratamientos de segunda línea la media es de 15. En ambos casos es más del doble de los seis esquemas diferentes por línea de tratamiento que recomienda la OMS. El problema se agrava ante el hecho de que muchos países están pagando precios más altos de lo necesario por los antirretrovirales, debido a los desabastecimientos y a las prácticas en las compras de medicamentos.

Otros hallazgos claves en el informe son:

Todos los países de América Latina y el Caribe tienen políticas de acceso gratuito a los tratamientos antirretrovirales como un derecho humano básico.

Al final de 2010, 521.000 personas en América Latina y el Caribe estaban recibiendo tratamiento antirretroviral, lo que representa en promedio un 63% de quienes necesitan este tratamiento.

Sólo 11 de 36 países en América Latina y el Caribe reportan una alta dependencia al financiamiento externo de los TAR. Estos países representan aproximadamente un 20% de las personas con VIH.

En el 2011, más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe (14 de 26 países) reportaron al menos un episodio de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales. Las causas pasaron por problemas con los procesos de licitación, compras, distribución y por complicaciones en la producción de antirretrovirales.

En 2010, las tasas de retención de las personas con VIH en el primer año de TAR variaron de un país al otro entre un 61% hasta un 100%.

En 14 países, sobre los que hay información disponible, el 37% de las persona con VIH acceden a la atención médica en un estado avanzado de inmunodeficiencia.

Ante estos hallazgos, el informe realiza una serie de recomendaciones para mejorar la sostenibilidad, efectividad, eficiencia, equidad y protección de los derechos fundamentales de la salud con respecto al tratamiento antirretroviral. Se focaliza en las áreas prioritarias identificadas en el nuevo enfoque de la OMS y ONUSIDA conocido como “Tratamiento 2.0”. Éste incluye: optimizar los esquemas de medicamentos, proveer acceso en el lugar de atención y otras plataformas simplificadas para realizar diagnósticos y monitorear a las personas con VIH, reducir costos, adaptar los sistemas de entrega, y movilizar el apoyo y participación de la comunidad.

Entre las recomendaciones específicas del informe dirigidas a las autoridades sanitarias de los países, figuran:

- Simplificar el tratamiento a través de una reducción del número de esquemas de tratamientos antirretrovirales hacia aquellos de efectividad más alta.
- Acelerar el uso de dosis fijas, combinaciones con una única pastilla para maximizar la adherencia del paciente al tratamiento.

- Eliminar gradualmente los medicamentos obsoletos, especialmente los altamente tóxicos como la estavudina.
- Aumentar el uso de mecanismos internacionales de compra, como por ejemplo el Fondo Estratégico de la OPS para respaldar los procesos de adquisiciones de los países.
- Revisar la prestación de servicios con modelos renovados basados en la información estratégica y en atención centrada en el paciente.
- Expandir y asegurar un diagnóstico temprano de la infección de VIH, mejorar la referencia a tratamientos, y fortalecer la vigilancia de la carga viral del paciente y del CD4.
- Promover una política de diálogo y explorar los recursos nacionales disponibles para reducir la dependencia en recursos externos para financiar los tratamientos retrovirales.
- Acelerar los programas de transferencia de la innovación y servicios como el uso apropiado de pruebas rápidas, algoritmos de diagnósticos simplificados, nuevas fórmulas de medicamentos, medidas para respaldar la adherencia al tratamiento, plataformas de vigilancia en la web para productos básicos estratégicos y medicamentos.

En la actualidad, las personas con VIH deben tomar antirretrovirales durante toda la vida. Se han visto grandes reducciones en las tasas de muertes y sufrimiento, cuando se usa un régimen potente de ARV, particularmente en las etapas más tempranas de la infección. El acceso expandido al TAR puede reducir la transmisión de VIH.

Adicionalmente, en América Latina, es difícil monitorear los logros en las formas de prevención del VIH, ya que no todos los países reportan datos previos al 2009 sobre el porcentaje de hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) que identifiquen las principales formas de prevención del VIH. Esto nos muestra la heterogeneidad de la información con la que se cuenta en la región y la dificultad

de establecer avances y monitorear las estrategias y realizar análisis más complejos de costo efectividad de las mismas.

En relación con el uso de condón en la última relación sexual anal de hombres que tienen sexo con otros hombres los reportes de los países indican que los porcentajes en 10 de los 17 países de la región son casi del 50% o mayor. Sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados, el estigma dirigido a los HSH ha impactado negativamente limitando el acceso a información y servicios preventivos así como a la atención oportuna. El alcance de los programas de prevención dirigidos a HSH en la región es variable. A modo de ejemplo, se reporta que el 31% de HSH en Honduras acceden a programas de prevención y el 98% en Argentina. Esto nos muestra que persisten diferencias entre los países de la región especialmente en Centroamérica y los países Andinos, en donde no hay suficientes programas de prevención dirigidos a este grupo.

En cuanto a la población joven, en el mundo, el conocimiento y la información que tienen ellos y ellas, en edades que oscilan entre 15 y 24 años de edad, en relación con la transmisión sexual del VIH ha incrementado. De la misma forma en América Latina, ha incrementado el porcentaje de jóvenes que rechazan las principales formas erróneas de transmisión del VIH. Este cambio ha sido cerca del 10% tanto en hombres como en mujeres comparando la información de 1999 al 2003 con la del 2009. Entre el 2004 y el 2009 el porcentaje de hombres con conocimientos sobre la infección, llegó cerca del 40% y aproximadamente al 30% en las mujeres (UNGASS, 2010). Así mismo se incrementó el uso del condón en su última relación sexual tanto para hombres como para mujeres, siendo casi el 30% en hombres y un poco más del 20% en mujeres. Sin embargo al analizar estos datos observamos que persisten diferencias entre hombres y mujeres dadas por la inequidad de género, situación económica, social y sexual.

Finalmente la estrategia de las Naciones Unidas para apoyar y motivar a los países a mejorar su respuesta a la epidemia, se centra en demostrar que todos los países pueden llegar a CERO: es necesario enfocar todos los esfuerzos para

tener cero nuevas infecciones por VIH por vía sexual y por transmisión vertical y entre usuarios-as de drogas; cero discriminación en contra las personas con VIH y cero muertes a causa del VIH avanzado.

VIII. DISEÑO METODOLOGICO.

Se administró una encuesta a las personas con VIH o VIH avanzado que asisten a las Unidades de Atención Integral de los servicios de salud o a los grupos de apoyo de Guatemala. El cuestionario a aplicar tiene información de los siguientes rubros:

Características sociodemográficas.

Consideración de futuras consecuencias.

Antecedentes sexuales.

Conocimientos, opiniones y actitudes respecto al VIH.

Enfermedades de transmisión sexual.

Condomes.

Situación de salud.

Discriminación, estigma apoyo y derechos.

Uso de alcohol y drogas.

Parejas estables y última relación sexual.

Relaciones sexuales con parejas ocasionales.

Trabajo sexual.

A. TIPO DE ESTUDIO

Investigación cuantitativa descriptiva de corte transversal, a realizarse en las Unidades de Atención Integral de Guatemala, durante el periodo de Junio a Octubre de 2012.

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO

i. Universo:

722 personas con VIH o VIH avanzado que asisten a las Unidades de Atención Integral(UAI) de los servicios de salud que brindan TAR Y 70 personas abordadas en sus hogares alcanzó la cifra de 792 personas.

ii. Muestra

Muestreo por conglomerado y multietápico

Para el cálculo de la muestra, se sacó la prevalencia de la población del universo objeto de estudio (11,115) en relación a la población total de Guatemala en mismo rango de edades (8,563,651)¹, dando una prevalencia del 0.18%

Etapa 1 Fórmula: Para el cálculo de la muestra base se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 pq N}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Dónde:

n = es el tamaño de la muestra.

Z = Es el nivel de confianza; 95% = 1,96

p = es la variabilidad positiva 50% = 0,5

q = es la variabilidad negativa 50% = 0,5

N = es el tamaño de la población: 11,115

E = es el error, 5% = 0,05

$$n = 3.8416 * 0.5 * 0.5 * 11,115 / (11,115*0.0025) + (3.8416*0.5*0.5)$$

$$n = 10674.85 / 28.7479$$

$$n = 371.33$$

¹http://indexmundi.com/guatemala/age_structure.html

Etapa 2: Efecto de Diseño: La encuesta está diseñada como una muestra por conglomerados (una selección representativa de las Unidades de Atención Integral de Guatemala) y no como una muestra aleatoria simple. A fin de corregir la diferencia en el diseño, el tamaño de la muestra se multiplica por el efecto de diseño (D). Por lo general se presupone un efecto de diseño igual a 2 para las encuestas que utilizan una metodología de muestreo por conglomerados.

$$n * D = (371.33 * 2) = 742.66$$

$$n = 742.66 \text{ personas}$$

Etapa 3 Imprevistos: El tamaño de la muestra se aumenta en un 5% para hacer frente a imprevistos como ausencia de respuestas en el instrumento o errores en su registro o captura.

$$n + 5\% = 742.66 * 1.05 = 779.78$$

$$n = 779.78$$

Etapa 4 Distribución: Por último, el resultado del cálculo se redondea hasta el número más próximo que mejor corresponda al número de conglomerados (12 UAI)

Tamaño final de la muestra n = 780 personas.

iii. Muestreo

El muestreo se ha realizado con base a una asignación de cuotas, según el total de personas que reciben atención en las Unidades de Atención Integral de Guatemala.

Asignación de cuotas final por cada UAI

Tabla No. 1: Unidades de Atención Integral de Guatemala.

<i>Unidades de atención Integral de Guatemala</i>	<i>Obs</i>	<i>Porcentaje</i>
1. <i>CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, HOSP</i>	96	13.30
2. <i>UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL, HOSP</i>	63	8.73
3. <i>HOSPITAL NACIONAL COATEPEQUE</i>	140	19.39
4. <i>HOSPITAL RODOLFO ROBLES</i>	86	11.91
5. <i>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS</i>	64	8.86
6. <i>NAHUALA</i>	25	3.46
7. <i>GENTE NUEVA</i>	58	8.03
8. <i>GAAPV</i>	28	3.88
9. <i>MUJERES PODEROSAS</i>	16	2.22
10. <i>GENTE POSITIVA</i>	25	3.46
11. <i>VIDA MAS</i>	25	3.46
12. <i>AMIGOS SOLIDARIOS DEL PROGRESO</i>	8	1.11
13. <i>SAGRADA FAMILIA</i>	30	4.16
14. <i>UNIDOS PARA UNA VIDA MEJOR</i>	14	1.94
15. <i>GRUPO NUEVA VIDA</i>	20	2.77
16. <i>ASI ES MAS</i>	13	1.8
17. <i>UNA LUZ EN EL CAMINO</i>	11	1.52
<i>Total</i>	722	100.00

iv. Criterios de inclusión y exclusión

a. Criterios de inclusión:

- Hombres y mujeres mayores de edad (≥ 18 años), con diagnóstico reactivo a VIH y que asisten a las Unidades de Atención Integral para su seguimiento y control o grupos de apoyo de Guatemala.
- Que hayan dado por escrito su consentimiento informado para ser parte del estudio.

b. Criterios de exclusión:

- Hombres y mujeres, que no acepten participar en el estudio (firma de consentimiento informado).

- Personas con VIH que se encuentra bajo los efectos de alcohol, drogas u otras sustancias al momento de la entrevista.
- Personas con VIH que no comprendan el consentimiento informado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se construyó el marco de muestreo con un listado de las unidades de atención integral (UAI) de personas diagnosticadas con VIH que asisten a las unidades y proporcionan TAR de Guatemala. El cuestionario a administrado tiene información de los siguientes rubros; consideración de futuras consecuencias, antecedentes sexuales, conocimientos, opiniones y actitudes respecto al VIH, enfermedades de transmisión sexual, condones, situación de salud, discriminación, estigma apoyo y derechos, uso de alcohol y drogas, parejas estables y última relación sexual, relaciones sexuales con parejas ocasionales, trabajo sexual.

Procedimiento de selección de los individuos encuestados

Se seleccionó de forma aleatoria a los individuos que asisten a los centros de ayuda para administrarles el cuestionario. Se parte del supuesto que el día de visita de un usuario no tiene asociación con sus conductas de riesgo.

Una limitación de este tipo de muestreo es el error de exclusión que resulta del hecho de que no todas las personas diagnosticadas con VIH acuden a los centros de ayuda.

Variables de estudio

Las variables objeto de estudio, se tomaron de las trece secciones originales, del protocolo regional del “Perfil de Riesgos de Personas con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+, el cual contempla un total de 207 preguntas, de acuerdo al instrumento presentado en el Anexo 1.

Para efectos de este estudio, en la tabla No. 3, se presentan las variables analizadas de la base original.

Tabla No. 3: Secciones objeto de estudio.

SOCIODEMOGRÁFICO	
Sección cuestionario original	No. de pregunta.
Sección 1. Antecedentes sociodemograficos	P102, P103, P104,P105,P113, P115,P119
Sección 3. Comportamiento sexual	P304, P305, P317, P318
Sección 2.Participación en grupos de autoayuda y perspectiva de futuro	P204,P205, P206,
Sección 4. Conocimientos, opiniones y actitudes respecto al vih	P420, P421,P423
Sección 5. Condones	
Sección 6 situacion de salud	P623, P627,P629
Sección 7. Discriminación, estigma apoyo y derechos	
Sección 8. Uso de alcohol y drogas	
Sección 9 relaciones sexuales con parejas estables	P901,P902,P905
Sección 10. Relaciones sexuales con parejas ocasionales	P1001
Sección 11. Relaciones sexuales con parejas comerciales	
Sección 12. Ultima relación sexual	P1202
Sección 13. Trabajo sexual	
Total de preguntas	25

C. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Se realizó un análisis descriptivo de las variables relevantes de la encuesta. Para el procesamiento de los datos utilizando el programa Epi-Info 7.1.0.6. El análisis se clasifico en cada una de las secciones que contienen las variables de estudio.

D. SEGUNDA FASE: ANÁLISIS BIVARIADO

Teniendo como ejes centrales el uso consistente del condón y la adherencia terapéutica se realizarán modelos bivariados con estas dos variables y las características sociodemográficas, información sobre VIH-Sida, adicciones, ITS, redes sociales, estigma y discriminación y acceso a servicios de salud. Se empleará la prueba estadística Chi² para identificar diferencias de proporciones al 95% y 99% de confianza estadística. Los datos se presentarán con tablas y gráficos.

E. TERCERA FASE: ANÁLISIS MULTIVARIADO

Se plantea dos modelos de regresión logística, uno para identificar las variables asociadas con el uso de condón en la última relación sexual y otro para identificar los factores asociados a la adherencia terapéutica. En ambos se tomarán en cuenta la percepción de riesgo de re-infección por VIH y consideración de futuras consecuencias como una variable explicativa adicional a las teóricamente identificadas.

IX.RESULTADOS

Los resultados presentados a continuación están divididos en 4 secciones, de acuerdo en la descripción de la medición:

- 1- Sociodemográfico
- 2- Perspectivas a futuro
- 3- Uso del Condón
- 4- Adherencia a la TAR

Características sociodemográficas:

La población estudiada son personas hombres y mujeres con VIH de Guatemala. El tamaño de la muestra final recolectada estuvo compuesta de 792 individuos de los cuales 722 fueron abordados en las unidades de atención integral que brindan terapia antirretroviral y 70 fueron abordados en sus hogares.

En referencia a la edad, se encontró que el 66% de los-as encuestados-as, está comprendido entre los 20 y 39 años de edad, al hacer el cruce entre sexo y orientación sexual se encontró que del total de los hombres, el 65% se auto determinan heterosexuales y el 28% se auto determinan homosexuales; en relación a las mujeres, se encontró que el 94% se auto determinan heterosexuales y el 3% homosexuales y el otro 3% bisexuales. Ahora, en relación a identidad de género se encontró que del total 77% de hombres se auto determinan masculinos y el 18% Trans, en cambio las mujeres, sólo el 3% se auto determinan masculinos y el 94% femeninos.

El 83.07% de los hombres encuestados saben leer y escribir y un 69.63% de las mujeres refieren saber leer y escribir; en referencia a la alfabetización, se encontró que un 16.48% de los hombres encuestados es analfabeta y un 26.93% de las mujeres refieren ser analfabeta; solo un 2.03% de los hombres son alfabetizados y de las mujeres solo un 4.01% es alfabetizada

En relación al ingreso mensual, el 27.54% de los hombres manifiestan tener ingresos mensuales entre 20057.11% de los hombres refirió contar con alguno; las mujeres refieren un 32.38%. Al hacer este mismo análisis comparado con orientación sexual, se encontró que los hombres autodenominados heterosexuales que manifiestan tener empleo representan un 24% y los hombres homosexuales un 23.7%. a 400 dólares al mes,

Perspectivas de Futuro

En cuanto a la percepción de si ellos-as podrían contribuir en algo para detener la epidemia de VIH se puede evidenciar que en general un 50% de las personas respondió afirmativamente, el uso del condón fue la respuesta más registrada.

También se investigó sobre la percepción de riesgo de reinfectarse por VIH, el 59% de los hombres respondieron que el riesgo es alto, en cambio las mujeres refieren que se pueden reinfectarse de VIH en un porcentaje menor de un 43% , el uso del condón para evitar la reinfección fue a respuesta más registrada. En este sentido y con la percepción de riesgo a la reinfección se indagó si habían participado en el último año en actividades de educación e información sobre VIH, el 59% de los hombres encuestados refiere que ha participado; el 40% de las mujeres refiere haber participado en actividades educativas en el último año, sin embargo a pesar de este hallazgo un 62% de los hombres encuestados refiere no poder hacer nada para prevenir la reinfección y un 38% de las mujeres refiere no poder hacer nada para prevenirlo.

Uso del Condón

Se examinó si los-as encuestado-as actualmente tienen pareja estable, el 50% refiere tener en la actualidad una pareja estable; a pesar que para evitar la reinfección y contribuir a detener la epidemia los encuestados usan condón con su pareja estable en un 78%; un 71.26% prefiere usar condón con su pareja ocasional, lo cual evidencia que casi un 30% no usa condón con su pareja

ocasional, por otra parte los encuestados-as no usaron condón en su última relación sexual, en un 41%.

Adherencia al Tratamiento

En relación a la ingesta de TAR en la actualidad un 88% en general toman medicamentos, a su vez en general un 44% refiere haber experimentado efectos adversos; sin embargo un 58% de los hombres refiere no haber experimentado efectos adversos y un 42% de las mujeres refiere haberlos tenido, lo cual evidencia que las mujeres experimenta más efectos colaterales con la terapia, sin embargo a pesar de ello se puede observar que hay una auto adherencia del 83%

1. Antecedentes Sociodemográficos.


1.1. Caracterización de la población objeto de estudio

Para la caracterización de la población objeto de estudio se tomó en cuenta a hombres y mujeres con VIH y VIH avanzado de Guatemala; en donde el tamaño de la muestra final recolectada estuvo compuesto de 792 individuos de los cuales 722 fueron abordados en las unidades de atención integral que brindan terapia antirretroviral y 70 fueron abordados en sus hogares.

A su vez se encontró que el 56% de estos corresponde a hombres y el 44% restante a mujeres. En referencia a la edad, se encontró que el 66% de los encuestados, está comprendido entre los 20 y 39 años de edad, (hombres 67% y mujeres 63%). (Ver gráfico No. 1); a su vez, al hacer el cruce entre sexo y orientación sexual se encontró que del total de los hombres, el 65% se auto determinan heterosexuales y el 28% se auto determinan homosexuales; en relación a las mujeres, se encontró que el 94% se auto determinan heterosexuales y el 3% homosexuales y el otro 3% bisexuales. Ahora, en relación a identidad de género se encontró que del total 77% de hombres se auto determinan masculinos


y el 18% Trans, en cambio las mujeres, sólo el 3% se auto determinan masculinos y el 94% femeninos. (Ver gráfico No.2).

Gráfico No. 1: Relación sexo y edad



Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

Gráfico No. 2: Relación sexo, orientación sexual e identidad de género




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

1.2. Educación

En relación a la educación se encontró que el 83.1% de los hombres encuestados saben leer y escribir y un 69.63% de las mujeres refieren saber leer y escribir; en referencia a la alfabetización, se encontró que un 16.48% de los hombres encuestados es analfabeta y un 26.93% de las mujeres refieren ser analfabeta; solo un 2.03% de los hombres son alfabetizados y de las mujeres solo un 4.01% es alfabetizada. (Ver gráfico No 3)

Gráfico No. 3: Relación sexo y educación




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA

1.3. Estado Civil

En relación al estado civil de los-as encuestados-as se encontró que el 47.86% de los hombres refirieron estar solteros; y en relación a las mujeres un 29.51% refiere estar solteras; en relación a estar casado-a o acompañado-a un 36.34% de los hombres está casado o acompañado y un 44.99% de las mujeres refiere estar casada o acompañada; en relación a estar separado o divorciado un 9.93% de los hombres refiere estar separado o divorciado y un 11.46% de las mujeres refiere estar separada o divorciada.

Grafico No.4: Relación sexo y estado civil




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgo de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA

1.4. Empleo

En relación a contar con un empleo remunerado el 57.11% de los hombres refirió contar con alguno; las mujeres refieren un 32.38%. Al hacer este mismo análisis comparado con orientación sexual, se encontró que los hombres autodenominados heterosexuales que manifiestan tener empleo representan un 24% y los hombres homosexuales un 23.7%. En este mismo sentido las mujeres heterosexuales representan el 28,37% y las mujeres homosexuales el 2.29% (ver gráfico No. 5)

En relación al ingreso mensual, el 27.54% de los hombres manifiestan tener ingresos mensuales entre 200 a 400 dólares al mes, frente al 10,6% de la mujeres. El porcentaje de hombres que manifiestan percibir ingresos menores a 200 dólares al mes es del 14,67% frente al 20,63% de las mujeres. (Ver gráfico No 7)


Gráfico No. 5: Relación sexo y empleo



Fuente:


Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

Gráfico No. 6: Relación empleo, sexo y orientación sexual



Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

Gráfico No. 7: Relación ingreso mensual y sexo




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

2. Perspectivas de Futuro

2.1. Contribución para detener la epidemia


Se preguntó acerca de la percepción de si ellos-as podrían contribuir en algo para detener la epidemia de VIH y en general un 55% de los hombres respondió afirmativamente seguido de un 45% de las mujeres (ver grafica No 8), el uso del condón fue la respuesta más registrada (Ver Gráfico No 9) 57% de los hombres dijo tener planes para el futuro, seguido de un 43% de las mujeres que respondieron afirmativamente. (Ver tabla No 3)

Gráfico No. 8: Puede contribuir en algo para detener la epidemia




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

Gráfico No. 9: Como puede contribuir para detener la epidemia



Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

Gráfico No. 10: Planes para el futuro




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

2.2. Riesgo de reinfectarse de VIH

Se indagó cuál considera que es el riesgo de reinfectarse por VIH, el 18% de los hombres respondieron era alto el riesgo, las mujeres refieren que se pueden reinfectarse de VIH en un 15.9 % alto, un 18.6 % de los hombres refiere que el riesgo es medio y un 36% de las mujeres; un 27.3 % de los hombres refiere que el riesgo de reinfectarse con VIH es bajo; y un 24.1% de las mujeres considera que reinfectarse de VIH tiene un riesgo bajo.(ver gráfico No 10)

Gráfico No. 10: Considera que su riesgo de reinfectarse por VIH es




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

2.3. Que puede hacer para prevenir la reinfección.

Se investigó que puede hacer para prevenir la reinfección, el 77.6% de los hombres refirió que el uso del condón en todas sus relaciones sexuales era eficaz para evitarlo, un 66.7% de las mujeres refiere que usando condón se previene la

reinfección; un 16% de los hombres refiere que no tener relaciones sexuales previene la reinfección, un 26.9% de mujeres refiere que abstenerse de tener relaciones sexuales previene la reinfección; un 3.6% de los hombres encuestados refiere no poder hacer nada para prevenir la reinfección y un 2.8% de las mujeres refiere no poder hacer nada para prevenirlo.(Ver gráfico No 11)

Gráfico No. 11: Qué puedo hacer para prevenir la reinfección




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+

2.3 Ha participado en el último año en actividades de educación y formación sobre VIH

Se indagó en los-as encuestados-as si han participado en el último año en actividades de educación e información sobre VIH el 59% de los hombres encuestados refiere que ha participado; el 40% de las mujeres refiere haber participado en actividades educativas en el último año (ver gráfico No 12)

Gráfico No. 12: Ha participado en el último año en actividades de educación e información sobre VIH




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

3. Uso del Condón

3.1. Pareja estable

Se examinó si los encuestado-as actualmente tienen pareja estable, el 38.2% de los hombres refiere tener en la actualidad una pareja estable; el 41.1% de las mujeres refiere tener una pareja estable (ver gráfico13)

Gráfico No. 13: Actualmente tiene pareja Estable




F

Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

3.2. Uso de condón última relación sexual.


Se sondeó en los encuestados si usaban condón con su pareja estable el 78.27 % de los encuestados refiere usar condón; el 71.26% prefiere usar condón con su pareja ocasional.(ver gráfico No 14). Se preguntó a los encuestados-as si usaron condón en su última relación sexual, en general el 58.71 % refiere haberlo usado, de estos el 60% son hombres y el 40% son mujeres. (Ver gráfico No 15)

Gráfico No. 14: Relación uso de condón última relación sexual y tipo de pareja



Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

Gráfico No. 15: Uso de condón última relación sexual




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

4. Adherencia al Tratamiento

4.1. Actualmente toma ARV

Se examinó en los-as encuestados-as si en la actualidad tomaban ARV, el 87.36% de los hombres refiere estar tomando y el 89.40% de la mujeres refiere que en la actualidad toma ARV; un 8.35% de los hombres encuestados refiere no estar ingiriendo ARV, y un 10.89% de las mujeres refiere no tomarlos, un 3.39% de los hombres no respondió a la pregunta y un 0.86 5 de las mujeres no responde (ver gráfico No 16)

Gráfico No. 16: Actualmente Toma ARV




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

4.2. Efectos adversos producidos por la terapia antirretroviral

Se investigó en los-as encuestados-as si habían tenido efectos adversos producidos por la terapia antirretroviral, en general un 44% refiere haber experimentado efectos adversos; un 58% de los hombres refiere no haber experimentado efectos adversos y un 42% de las mujeres refiere haberlos tenido.

(Ver gráfico No 17)

Gráfico No. 17: Ha tenido efectos adversos producidos por la terapia antirretroviral




Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

4.3. Suspensión de toma de ARV

Se preguntó a los encuestados sobre la auto adherencia, en general se reportó una auto adherencia del 83.12% (ver gráfico No 18)

Gráfico No. 18: Suspensión de toma de ARV



Fuente: Construcción a partir de la base de datos del perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala, Programa Regional REDCA+.

X. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Según ONUSIDA el número de personas que tienen acceso al tratamiento Antirretroviral ha aumentado 22 veces desde el 2001. Se estima que 6,6 millones de personas de países de ingresos medianos y bajos estaban recibiendo el TAR a fines de 2010. Entre 8 y 9 millones de personas que necesitan TAR todavía no lo reciben y muchos ni siquiera conocen su estado con respecto a la infección por el VIH. Si no se toman medidas enérgicas para ampliar los ensayos y el acceso al TAR, muchas de estas personas podrían morir.

En el 2010 1,4 millones de personas comenzaron el tratamiento y se redujo el número de personas que murieron por causas relacionadas con el VIH avanzado con respecto a años anteriores. El TAR ha reducido las muertes anuales en 20% por comparación con el 2005 y ha permitido ganar más de 14 millones de años de vida desde 1996. En países con cobertura antirretroviral alta, la tasa de mortalidad anual relativa al VIH avanzado ha disminuido más de 50% en los países de ingresos medianos y bajos, además de que se han registrado reducciones notables en la incidencia de la tuberculosis y otras infecciones oportunistas.

La utilización del preservativo o condón es un elemento crucial para un enfoque integral, eficaz y sostenible de la reinfección del VIH, y conviene acelerar su promoción. Se estima que en 2007 alrededor de 2,7 millones de personas se infectaron por el VIH. Cerca del 45% de ellas eran jóvenes de 15 a 24 años de edad, y las muchachas estaban más expuestas a la infección que los muchachos. El preservativo o condón masculino de látex es la tecnología individual disponible más eficaz para reducir la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

El desarrollo de nuevas tecnologías de prevención, como las vacunas contra el VIH y los microbicidas, continúa avanzando, pero los condones seguirán siendo

por muchos años el principal medio de prevención. Los condones son un elemento clave de las estrategias combinadas de prevención a las que las personas pueden optar en diferentes momentos de sus vidas para reducir los riesgos de la exposición sexual al VIH o la reinfección. Las pruebas concluyentes de numerosas investigaciones efectuadas entre parejas heterosexuales en las que uno de los miembros está infectado por el VIH ponen de manifiesto que la utilización correcta y sistemática del condón reduce de forma significativa el riesgo de transmisión del VIH tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. Los programas de prevención deben velar por la disponibilidad de los condones de alta calidad para las personas con VIH que los necesitan y cuando los necesitan, y asegurar que tengan los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para utilizarlos correctamente. Por otra parte la modificación del cambio de comportamiento es uno de los aspectos más significativos que se debe lograr en la prevención de la reinfección por VIH y otras ITS; sin embargo, es uno de las más difíciles de tratar por diversas razones: el sexo causa placer, procrea y dentro de su propio contexto significa poder; tiene un lenguaje mudo y se practica pero no se discute en muchas culturas del mundo. Tales riesgos están en relación con la alta prevalencia de actividad sexual sin protección, que deriva de algunos factores como: la inadecuada o ineficiente información sobre la sexualidad humana en muchas culturas, los riesgos asociados a ellas, la forma de prevenirlas y el nivel sociocultural entre otros. Con relación a la conceptualización de la percepción del riesgo, una definición posible y bastante frecuente en la literatura respecto al riesgo percibido, es concebir este constructo como la evaluación que un sujeto hace de la probabilidad de que un evento adverso ocurra en el futuro y de sus consecuencias probables (Barrientos, 1998). Aunque a primera vista esta definición puede resultar bastante coherente, parece que lo que está sugiriendo es que los sujetos operan con probabilidades numéricas de ocurrencia de determinados eventos y de sus posibles consecuencias. Por ello, para estudiar la percepción de riesgo, se debe estudiar las creencias, actitudes, juicios, sentimientos, emociones y valores que las personas con VIH tienen o adoptan frente a los riesgos; con ello podemos dimensionar cual es la perspectivas a futuro de las personas con VIH, en la construcción de su proyecto de vida, el cual debe

considerar aspectos tales como: el entorno y conocimiento de la persona; la búsqueda de información para satisfacer las inquietudes y posibilidades que les rodean para alcanzar sus metas propuestas; y la flexibilidad, que no debe faltar, pues las personas con VIH y VIH Avanzado poseen múltiples intereses, habilidades y la capacidad de rectificar, además los resultados no dependen sólo la persona, al definir su proyecto de vida y percepciones a futuro las personas pueden defender lo que piensan , sus intereses y formarse un carácter menos vulnerables desde la perspectiva biopsicosocial.

Los resultados obtenidos son presentados a continuación para cada una de las secciones propuestas previamente:

En el aspecto socio demográfico, se mantiene una tendenciacaracterísticade los datos estadísticos de la población diagnosticada con el VIH o VIH avanzado de Guatemala en general; se mantiene rangos etáreo de edad económica y sexualmente productivas. Al hacer una comparación con la prevalencia del VIH en la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de Guatemala, se evidencia un contexto de homofobia generalizada, produciendo una epidemia oculta de VIH entre HSH. Pues al hacer el cruce entre sexo y orientación sexual se encontró que del total de los hombres, solo el 65% se auto determinan heterosexuales y el 28% homosexuales, por otra parte en relación a la identidad de género se encontró que del total 77% de hombres se auto determinan masculinos y el resto se autodenomina transexual, lo cual podría estar relacionada con homofobia generalizada.

Según el Consejo Nacional de Alfabetismo CONALFA de Guatemala se logró reducir a 17% por ciento el analfabetismo al concluir el 2011, sin embargo se encontró en base a los datos proporcionados por el perfil de riesgos de personas con VIH de Guatemala del Programa Regional REDCA que un 43.41 % de los personas encuestadas refieren ser analfabetas, de los cuales solo un 6.04% de estas es alfabeto-a es decir que hay una gran diferencia en relación de la población general y las personas con VIH o VIH Avanzado. De estas más del 70%

solo saben leer y escribir lo cual está directamente relacionado con el bajo ingreso mensual que percibe, el cual no cubre sus necesidades básicas, y tener acceso a un empleo bien remunerado por su escasa formación académica.

En relación a la percepción de si los encuestados-as podrían contribuir en algo para detener la epidemia de VIH, en general respondieron afirmativamente, el uso del condón fue la respuesta más registrada por los hombres, sin embargo en las mujeres se evidencia que ellas perciben que usar el condón puede contribuir a detener la epidemia en menos porcentaje.

En la campaña Bajo el lema “No todos los hombres son iguales”, de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID) en coordinación con Pasmó basado en un estudio cualitativo de masculinidades y basándose en las opiniones de la mujeres. “Lo que las mujeres piensan que es un “hombre de verdad”, realizada desde octubre del año 2011 hasta marzo de 2012 a mujeres de 18 a 40 años de edad en diferentes países de centro américa incluyendo Guatemala, Las mujeres insisten en que un “hombre de verdad” es un hombre fiel, sin embargo, concluyeron que es difícil encontrar a un hombre así. Por otra parte el uso del condón es el que genera más controversias, mientras que algunas mujeres ven esta práctica como señal de responsabilidad y protección, al mismo tiempo que otras, lo consideran como un signo de infidelidad y falsedad. Lo cual evidencia aun actitudes machistas e inequidades de género en la población femenina en general. Lo cual puede explicar el por qué las mujeres con VIH de Guatemala perciben que el condón contribuye a detener la epidemia en menos proporción que los hombres.

Por otra parte a pesar que los-as encuestados-as refieren haber participado en el último año en actividades de educación e información sobre VIH, de las cuales desde el 2011 el Programa Regional REDCA+ implemento la Metodología para cambios de comportamientos “*Porque soy capaz, yo actuó*” en donde se aborda el tema de la prevención secundaria, un veintinueve por ciento no usa condón con su pareja ocasional de los cuales un 40 por ciento refiere no haber usado condón en su última relación sexual en general. Lo cual evidencia que el condón ha

dejado de ser una barrera de protección para las personas con VIH de Guatemala y su percepción de riesgo a reinfectarse o adquirir otras infecciones de transmisión sexual con el uso consistente del mismo es bajo.

Finalmente en Guatemala según reportes del año 2012 de ONUSIDA se ofrece una cobertura de tratamiento antirretroviral del 56%, un porcentaje superior a la media mundial (54%) e inferior a la cobertura regional (65%). Según datos de 2011, 13.585 personas tienen acceso a tratamiento, frente a las 10.362 de 2009, lo cual evidencia que las personas con VIH encuestadas en el perfil de riesgo del Programa Regional de la REDCA+ toman ARV en la actualidad en un ochenta y siete por ciento. En comparación a una década los efectos adversos de los medicamentos han disminuido sustancialmente en casi un 42% por ciento, lo cual podría dar respuesta a la alta auto adherencia reportada en el estudio.

XI.CONCLUSIONES

Existe una relación entre calidad de vida, el uso del condón y la adherencia al tratamiento antirretroviral de las personas con VIH de Guatemala la cual sido significativa en la mayoría de los hallazgos, centrándose principalmente en:

El uso del condón debe continuar promocionándose en los grupos de personas con VIH, además de estar disponibles, ya que las personas entrevistadas refieren que su uso contribuye a detener la epidemia de VIH, sin embargo algunas personas no lo usan con sus parejas casuales, por ende debe ser parte de la educación en prevención secundaria. Es evidente que ha disminuido la percepción de las persona con VIH, en aspectos relacionados al uso adecuado y consistente del condón ya que más del cuarenta por ciento refiere no haberlo usado en su última relación sexual, lo cual amerita promocionar la prevención secundaria con ellos-as.

El espacio de los grupos de apoyo de las personas con VIH, debe sufrir una reingeniería para empoderar a las personas con VIH y dar continuidad al fin con el cual fueron creados de tal forma que los usuarios conozcan más su situación de salud, y esto contribuya a mejorar su calidad de vida y percepción de vida a futuro.

La adherencia al tratamiento es fundamental para mejorar la cantidad y calidad de vida de las personas con VIH de Guatemala, sin embargo debe de hacerse un estudio que identifique cuales son los medicamentos que están provocando más toxicidad y efectos colaterales en las personas para contrarrestar los mismos que inciden en algunas personas en abandonar la TAR

Se debe realizar en coordinación del equipo multidisciplinario actividades educativas enfocadas hacer cambios de comportamientos, inteligencia emocional y proyectos de vida en las personas con VIH de Guatemala

XII. RECOMENDACIONES

El Ministerio de Salud de Guatemala debe realizar un estudio sobre el impacto que la terapia antirretroviral ha tenido en las personas con VIH, por la prolongación de la vida de las mismas, lo cual incide directamente en sus perspectivas a futuro.

El Ministerio de Educación de Guatemala debe realizar un estudio del impacto que tiene la formación académica en personas con VIH lo cual mejora sus ingresos y por ende su calidad de vida.

Las organizaciones no gubernamentales con trabajo en VIH y VIH avanzado de Guatemala, deben establecer procesos de educación continua, tendientes a actualizar a los-as usuarios-as de la importancia de la adherencia y el uso del condón para evitar multiresistencia a drogas antirretrovirales.

Los centros de salud de Guatemala deben mantener procesos de capacitación constante, para las personas con VIH, que contribuya a mejorar la capacidad de respuesta a los-as usuarios-as, en los temas de prevención secundaria, adherencia al tratamiento antirretroviral, proyecciones y planes de vida a futuro.

La Red Centroamericana de Personas con VIH, debe continuar desarrollando e implementando metodologías para cambios de comportamiento, con su respectivo monitoreo, a fin de continuar empoderando a las personas con VIH del Guatemala, para contribuir en la mejora de su calidad de vida.

XIII. BIBLIOGRAFÍA

- Piura López, Julio. Managua, séptima edición, Nicaragua, 2012 Metodología de la Investigación científica
- Golcher Elena sexta edición Panamá 2003 Escriba y sustente su tesis Elia B Pineda, Eva Luz de Alvarado, tercera edición, Metodología de la Investigación OPS
- Pineda B Elia, Alvarado Eva Luz, tercera edición Organización Panamericana de la Salud
- Plan estratégico institucional para la prevención, atención y control de ITS, VIH-sida, 2010-2015 Guatemala
- Informe “Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de salud pública en Latinoamérica y el Caribe” OPS 2012
- Estrategia Tres Ceros de ONUSIDA 2011
- Informe de la Consulta Regional en Latinoamérica sobre los Progresos hacia el Acceso
- Universal a la prevención, tratamiento, cuidado y apoyo en VIH/SIDA. 2011
- REDCA+, 2012. Protocolo Regional para levantar el perfil de riesgos de las personas con VIH en Centroamérica.
- Strathman A., Gleicher, F., Boninger, D. and Edwards, C. (1994) the Consideration of Future Consequences: Weighing Immediate and Distant Outcomes of Behavior’, Journal of Personality and Social Psychology
- Estudio Antropológico Multiétnico sobre Comportamiento, actitudes y prácticas de la población Maya sobre ITS, VIH y sida y uso del Condón, y Estrategias de abordaje sobre la Sexualidad Humana en Guatemala”. Asociación IDEI. 2005

ANEXOS

- Cuestionario del Perfil de Riesgo de Personas con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+”
- Carta de consentimiento informado

Tabla de resumen del cuestionario

Sección	No. preguntas
Sección 1. ANTECEDENTES SOCIODEMOGRAFICOS	20
Sección 2. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PERSPECTIVA DE FUTURO	17
Sección 3. COMPORTAMIENTO SEXUAL	19
Sección 4. CONOCIMIENTOS, OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO AL VIH	24
Sección 5. CONDONES	10
Sección 6 SITUACION DE SALUD	40
Sección 7. DISCRIMINACIÓN, ESTIGMA APOYO Y DERECHOS	17
Sección 8. USO DE ALCOHOL Y DROGAS	07
Sección 9 RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS ESTABLES	10
Sección 10. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS OCASIONALES	07
Sección 11. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS COMERCIALES	09
Sección 12. ULTIMA REALCIÓN SEXUAL	07
Sección 13. TRABAJO SEXUAL	20
TOTAL DE PREGUNTAS	207

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES SOCIODEMOGRÁFICOS

A continuación vamos a iniciar la entrevista con algunas preguntas generales. Recuerde que sus respuestas se mantendrán confidenciales.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P101	¿Cuál es su fecha de nacimiento?	Día ___ Mes ___ Año _____ No sabe 77	
P102	¿Cuántos años cumplidos tiene?	Edad en años cumplidos [__][__] No contesta 98	
P103	¿Cuál es su sexo? Por sexo entendemos las diferencias biológicas que determinan el ser hombre o mujer.	ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS [__][__] Hombre 1 Mujer 2 No contesta 98	
P104	¿Sabe leer y escribir?	Sí 1 No 2 No contesta 98	
P105	¿Qué nivel de estudios tiene? ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[__][__] No asistió a la escuela 1 Alfabetizada 2 Primaria incompleta 3 Primaria completa 4 Secundaria incompleta 5 Secundaria completa 6 Universitaria incompleta 7 Universitaria completa 8 No contesta 98	
P106	¿Actualmente estudia? ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[__][__] Sí 1 No 2 No contesta 98	
P107	¿Cuál es su religión? ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[__][__] Católica 1 Evangélica 2 Testigo de Jehová 3 Presbiteriana 4 Mormón 5 Anglicana 6 Ninguna 7 Otra 8 Especifique _____ No contesta 98	
P108	¿En donde vive actualmente? ANOTE LA RESPUESTA EN LA LÍNEA	Ciudad _____ Departamento _____ País _____	
P109	¿Cuánto tiempo tiene viviendo en este lugar? ANOTE 00 EN AÑOS SI LA PERSONA NO HA CUMPLIDO UN AÑO VIVIENDO EN EL LUGAR Y ANOTE LOS DÍAS Y LOS MESES	[__][__]Días [__][__]Meses [__][__]Años No contesta 98	Anote 98 en la casilla si no contesta

P110	En el momento en que usted se enteró que tenía VIH, ¿vivía en este mismo lugar? ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][]	Si 1 No 2 No contesta 98	→ P112
P111	¿Por qué cambio el lugar donde vivía después de enterarse que tenía VIH? ANOTE SOLO UN CÓDIGO DE RESPUESTA EN LAS CASILLAS.	[][]	No cambie de lugar de residencia 1 Por rechazo o maltrato de la comunidad (vecinos, amigos, familia) 2 La familia no quería que estuviera ahí 3 Por trabajo 4 Por tratamiento médico 5 Otra razón 6 Especifique _____ No contesta 98	
P112	¿Alguna vez ha estado casado/a, acompañado/a o en unión libre? ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][]	Si 1 No 2 No contesta 98	
P113	Actualmente ¿Cuál es su estado civil? ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][]	Soltero/a 1 Casado/a o acompañado/a 2 Separado/a o divorciado/a 3 Viudo/a 4 No contesta 98	
P114	¿Con quién o quienes vive actualmente? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA		SI NO a. Vive con su pareja 1 2 b. Vive con la familia de su pareja 1 2 c. Vive con su familia 1 2 d. Vive solo/a 1 2 e. Vive con amiga (o) 1 2 f. Otro 6 1 2 g.(Especifique) _____ 1 2	
P115	¿Actualmente tiene empleo remunerado? ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][]	Si 1 No 2 No contesta 98	
P116	¿Qué tipo de empleo le genera su ingreso principal? LEER RESPUESTAS ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][]	Empleo Profesional 1 Comerciante 2 Estilista 3 Empleado/a (tienda, maquila, fabrica) 4 Domestica 5 Vendedor/a ambulante 6 Trabajo sexual 7 Promotores /Educador 8 Negocio propio 9 No tengo trabajo 10 Otra 11 Especifique _____ No contesta 98	
P117	Además del empleo ya referido, ¿Tiene otra fuente de ingreso con la que gana dinero? ANOTE EL CÓDIGO DE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][]	Si 1 No 2 No contesta 98	→ P119 → P119

P118	¿Cuál es esa otra fuente de ingreso que tiene? ANOTE LA RESPUESTA EN LA LÍNEA	Otra fuente de ingreso _____	
P119	Podría decirnos ¿Cuál es su ingreso o cuanto gana al mes aproximadamente en dólares americanos? AYUDAR AL ENTREVISTADO(A) A SACAR EL INGRESO MENSUAL APROXIMADO. SI NO TIENE INGRESOS; ANOTE CEROS EN LAS CASILLAS	Cantidad en dólares americanos [][] , [][][] Sin ingreso 00,000 No sabe /No contesta 99,999 Ejemplo: 425 dólares]0_] 0_] ,]4_]2_]5_]	
P120	¿Cuántas personas mantiene o dependen económicamente de usted? Esto incluye hijos, padres, familiares u otras personas. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	Número de personas [][] Ninguna persona 00 No contesta 98	

SECCIÓN 2: PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PERSPECTIVA DE FUTURO

PREGUNTA P201 P202 y P203:

SE REALIZA ÚNICAMENTE A INDIVIDUOS ENTREVISTADOS EN UN CENTRO DE AUTOAYUDA. PARA INDIVIDUOS ENTREVISTADOS EN SUS HOGARES, ANOTAR NO CONTESTA/NO APLICA 98

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P201	¿Hace cuanto tiempo acude a este grupo de auto ayuda?	___ Día ___ Mes ___ Año No contesta/No aplica 98	
P202	¿Conoce a alguna persona con VIH que no acuda ni a este ni a otro grupo de auto ayuda? ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Sí 1 No 2 No sabe 77 No contesta/No aplica 98	→ P204
P203	¿Cuántas personas con VIH conoce que no acudan ni a este ni a otro grupo de auto ayuda? ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA	Número de personas [][] Ninguna 00 No contesta/No aplica 98	
P204	¿Considera que usted puede contribuir en algo para detener la epidemia de VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Sí 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	→ P206

P205	¿Cómo puede contribuir a detener la epidemia de VIH? NO LEER RESPUESTAS: MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	a. Usando condón en todas mis relaciones sexuales b. Tomando mis medicamentos sin interrupción c. Siendo fiel o teniendo una sola pareja d. No teniendo sexo e. Participando activamente en alguna ONG f. Cuidando mi salud g. No hay nada que yo pueda hacer h. Otro i. Especifique _____	Si No 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	
P206	¿Tiene usted planes para el futuro? ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Sí 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P207	¿Cree usted que puede hacer algo para incidir positivamente en su futuro? ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Sí 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P208	¿Considera que en el futuro usted estará mejor, peor o igual que ahora? ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Mejor 1 Peor 2 Igual 0 No sabe 77 No contesta 98	
CONSIDERACIÓN DE FUTURAS CONSECUENCIAS				
A continuación le vamos a leer algunas afirmaciones y le pedimos que piense en que tan de acuerdo o desacuerdo está usted con ellas, para responder considere lo que usted piensa o haría de encontrarse en situaciones similares. La escala de respuestas que puede dar son los siguientes:				
1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) No sabría decirle 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo				
P209	Cuando quiero conseguir algo, me fijo metas y considero los medios para poder conseguirlos. LEER RESPUESTAS. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Totalmente en desacuerdo 1 En desacuerdo 2 No sabría decirle 3 De acuerdo 4 Totalmente de acuerdo 5 No contesta 98	
P210	Preparar el trabajo para el día siguiente y cumplir con los plazos se antepone a la diversión de hoy en la noche. LEER RESPUESTAS. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Totalmente en desacuerdo 1 En desacuerdo 2 No sabría decirle 3 De acuerdo 4 Totalmente de acuerdo 5 No contesta 98	
P211	Me molesta mucho llegar tarde a mis	[] []	Totalmente en desacuerdo 1	

	<p>citas o compromisos.</p> <p>LEER RESPUESTAS. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS</p>		<p>En desacuerdo 2 No sabría decirle 3 De acuerdo 4 Totalmente de acuerdo 5</p> <p>No contesta 98</p>	
P212	<p>Cumplo a tiempo con las obligaciones que tengo con mis amigos y jefes.</p> <p>LEER RESPUESTAS. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS</p>	[][]	<p>Totalmente en desacuerdo 1 En desacuerdo 2 No sabría decirle 3 De acuerdo 4 Totalmente de acuerdo 5</p> <p>No contesta 98</p>	
P213	<p>Antes de tomar una decisión valoro los costos y los beneficios.</p> <p>LEER RESPUESTAS. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS</p>	[][]	<p>Totalmente en desacuerdo 1 En desacuerdo 2 No sabría decirle 3 De acuerdo 4 Totalmente de acuerdo 5</p> <p>No contesta 98</p>	
P214	<p>Termino mis proyectos a tiempo, avanzando de manera estable y continua.</p> <p>LEER RESPUESTAS. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS</p>	[][]	<p>Totalmente en desacuerdo 1 En desacuerdo 2 No sabría decirle 3 De acuerdo 4 Totalmente de acuerdo 5</p> <p>No contesta 98</p>	
P215	<p>Hago listas de las cosas por hacer.</p> <p>LEER RESPUESTAS. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS</p>	[][]	<p>Totalmente en desacuerdo 1 En desacuerdo 2 No sabría decirle 3 De acuerdo 4 Totalmente de acuerdo 5</p> <p>No contesta 98</p>	
P216	<p>Soy capaz de resistir las tentaciones cuando sé que hay trabajo por hacer.</p> <p>LEER RESPUESTAS. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS</p>	[][]	<p>Totalmente en desacuerdo 1 En desacuerdo 2 No sabría decirle 3 De acuerdo 4 Totalmente de acuerdo 5</p> <p>No contesta 98</p>	
P217	<p>Me mantengo trabajando en tareas poco interesantes, si éstas me ayudan a salir adelante.</p> <p>LEER RESPUESTAS. ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS</p>	[][]	<p>Totalmente en desacuerdo 1 En desacuerdo 2 No sabría decirle 3 De acuerdo 4 Totalmente de acuerdo 5</p> <p>No contesta 98</p>	

SECCIÓN 3: COMPORTAMIENTO SEXUAL

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas personales sobre su vida sexual.
 Recuerde que sus respuestas se mantendrán confidenciales.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P301	¿A qué edad tuvo usted su primera relación sexual? Por relación sexual nos referimos a la penetración del pene en vagina, ano ó boca.	Edad en años: [][] No contesta 98	
P302	¿Usó condón en su primera relación sexual? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][] Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P303	¿Con quien tuvo esa primera relación sexual? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][] Novio/a 1 Amigo/a/ conocido/a 2 Desconocido/a 3 Persona que pago por relaciones sexuales 4 Esposo o marido/ Esposa o mujer 5 Desconocido/a 6 Miembro de mi familia pero no esposo/a 7 Otro 8 Especifique _____ No contesta 98	
INICIA SECCIÓN SOLO PARA MUJERES. APLICAR ESTA SECCIÓN SOLO A MUJERES P304-P316			
P304	Por sus prácticas sexuales ¿Cómo se identifica? ESPERAR RESPUESTA ESPONTANEA, SI NO HAY RESPUESTA, INDAGAR SOLO SE PUEDE ELEGIR UNA RESPUESTA ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][] Heterosexual 1 Bisexual 2 Homosexual 3 Otro 4 Especifique _____ No sabe 77 No contesta 98	DE 304 A 326 SOLO A MUJERES
P305	¿Su identidad de género es? ESPERAR RESPUESTA ESPONTANEA, SI NO HAY RESPUESTA, INDAGAR SOLO SE PUEDE ELEGIR UNA RESPUESTA ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][] Femenino 1 Masculino 2 Trans 3 Otro 4 Especifique _____ No sabe 77 No contesta 98	
P306	Durante los últimos 12 meses ¿ha tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	
P307	¿Ha estado embarazada alguna vez? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	→ P314 → P314
P308	Durante su último embarazo ¿Asistió o asiste a control prenatal? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	→ P314 → P314

P309	En su último embarazo, ¿Recibió información sobre el riesgo de transmisión del VIH de la madre al hijo? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98	
P310	En su último embarazo, ¿Le ofrecieron la prueba de VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98	
P311	En su último embarazo, ¿Le realizaron la prueba de VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98	
P312	Durante ese último embarazo ¿Usted ya conocía su diagnóstico por VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98	
P313	Su último embarazo finalizó por: ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Parto vaginal 1 Cesárea 2 Aborto inducido o provocado 3 Aborto espontaneo 4 Otro 5 Especifique _____ No contesta 98	
P314	Después de conocer que usted es una persona con VIH, ¿utiliza algún método de planificación familiar? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98	→ P316
P315	¿Qué métodos de planificación familiar utiliza? ESPERAR RESPUESTA ESPONTANEA MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA		Si No a. Pastillas anticonceptivas 1 2 b. Métodos inyectables 1 2 c. Dispositivos intrauterinos 1 2 d. Condones o preservativos 1 2 e. Esterilización quirúrgica 1 2 f. Métodos naturales (Billings, temperatura o calendario?) 1 2 g. No utiliza ningún método de planificar 1 2 h. Otro 1 2 i. Especifique _____	
P316	¿Por qué motivo no utiliza métodos de planificación familiar? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Se quiere embarazar 1 No sabe donde conseguirlos 2 No lo considera necesario 3 Su pareja se lo prohíbe 4 No le gustan 5 Otro 6 Especifique _____ No contesta 98	Solo para las personas que no utilizan ningún método

INICIA SECCIÓN SOLO PARA HOMBRES. FINALIZA SECCIÓN SOLO PARA MUJERES APLICAR ESTA SECCIÓN SOLO A HOMBRES P317-P319			
P317	¿Cómo se identifica sexualmente? ESPERAR RESPUESTA ESPONTANEA, SI NO HAY RESPUESTA, INDAGAR SOLO SE PUEDE ELEGIR UNA RESPUESTA	[] [] Especifique _____	Heterosexual 1 Bisexual 2 Homosexual 3 Otro 4 No sabe 77 No contesta 98
P318	¿Su identidad de género es? ESPERAR RESPUESTA ESPONTANEA, SI NO HAY RESPUESTA, INDAGAR SOLO SE PUEDE ELEGIR UNA RESPUESTA	[] [] Especifique _____	Femenino 1 Masculino 2 Trans 3 Otro 4 No sabe 77 No contesta 98
P319	Durante los últimos 12 meses ¿ha tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, o con homosexuales o Trans? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98

APLICAR DE 327 A 329 SOLO A HOMBRES

→ P401

SECCIÓN 4: CONOCIMIENTO, OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO AL VIH

A continuación estaremos haciendo algunas preguntas de conocimiento y opiniones sobre VIH. Recuerde que, sus respuestas se mantendrán confidencialmente.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P401	¿Ha escuchado alguna vez sobre el VIH o el SIDA? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98
P402	¿El VIH se puede transmitir al tener relaciones sexuales sin condón? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98
P403	¿El VIH se puede transmitir al recibir una transfusión con sangre infectada? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98
P404	¿El VIH se puede transmitir por la picadura del zancudo? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98
P405	¿El VIH se puede transmitir por compartir una comida con alguien que está infectado con el VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98
P406	¿El VIH se puede transmitir por usar una aguja que había sido usada por alguien que ya estaba infectado con el VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98

P407	¿El VIH se puede transmitir por usar servicios sanitarios públicos? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P408	¿El VIH se puede transmitir de una mujer embarazada infectada con el VIH, a su hijo? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P409	¿El VIH se puede transmitir al besar a una persona infectada con el VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P410	¿El VIH se puede transmitir al compartir cubiertos o platos con alguien infectado con el VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P411	¿El VIH se puede transmitir al dar la mano o abrazar a alguien infectado con el VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P412	¿Puede una mujer con VIH o SIDA transmitir el virus a su hijo a través de la lactancia materna? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P413	¿Qué puede hacer una mujer que esta embarazada y que esta infectada con el VIH, para prevenir la transmisión del VIH a su hijo? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA RESPUESTAS ESPONTÁNEAS NO LEER RESPUESTAS MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	a. Ponerse en control médico b. Tomar medicamento antirretrovirales c. Pedir que le hagan cesárea d. No amamantar al bebé e. Otra f. Especifique _____	SI NO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	
P414	¿Cree usted que usando el condón de manera correcta y en cada relación sexual, se puede prevenir el VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P415	¿Cree usted que siendo fiel a una sola pareja sexual que no tenga VIH, se puede prevenir el VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P416	¿Cree usted, que al no tener relaciones sexuales, se puede prevenir el VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	

P417	¿Cree usted que una persona que se ve saludable, puede estar infectada con el VIH? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P418	¿Qué personas cree usted tienen más riesgo de infectarse con el VIH? PUEDA ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA RESPUESTAS ESPONTÁNEAS NO LEER RESPUESTAS MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA		SI NO a. Todas las personas 1 2 b. Las mujeres trabajadoras del sexo 1 2 c. Los que usan drogas 1 2 d. Hombres que tienen sexo con hombres 1 2 e. Nadie 1 2 f. Otras 1 2 g. Especifique_____	
P419	¿Cree usted que una persona con VIH pueda re-infectarse, es decir que aunque haya sido diagnosticada una vez con el VIH pueda volverse a infectar? ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	
P420	Usted considera que su riesgo de re-infectarse por VIH es: ANOTE LA RESPUESTA EN LAS CASILLAS	[] []	Alto 1 Medio 2 Bajo 3 Ningún riesgo 4 No sabe 97 No contesta 98	
P421	¿Qué pueden hacer las personas con VIH para prevenir la reinfección? MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA		SI NO a. Usar condón en toda relación sexual 1 2 b. No tener relaciones sexuales 1 2 c. No puede hacer nada 1 2 d. Otra 1 2 e. Especifique_____	
P422	Dentro de este grupo de autoayuda ¿En qué actividades ha participado o participa? PUEDA ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA DEJAR RESPUESTAS ESPONTÁNEAS, SI NO HAY, INDAGAR. MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA		SI NO a. Compartiendo mi experiencia de vida 1 2 b. Brindando acompañamiento y apoyo 1 2 c. Brindando educación 1 2 d. Realizando visitas domiciliarias 1 2 e. Facilitadora de capacitaciones 1 2 f. Motivando a otro/as 1 2 g. Asistiendo a capacitaciones 1 2 h. Consejería 1 2 j. Foros 1 2 j. Campañas 1 2 k. Caravanas / marchas 1 2 l. Otras actividades m. Especifique_____	

P423	¿En el último año ha participado en actividades de información o educación sobre VIH y sida, tales como charlas, talleres?	[][]	Sí 1 No 2 No contesta 98
-------------	--	--------	--------------------------------

SECCIÓN 5: CONDONES

A continuación estaremos haciendo algunas preguntas sobre el condón. Recuerde que sus respuestas se mantendrán confidenciales

No.	Pregunta	Categorías de codificación	Pase a																																													
P501	¿Qué lugares o personas conoce donde podría conseguir condones? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	<table> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>a. Supermercado/Tienda</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. Farmacia</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Clínica Privada</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Centro de Salud/Hospital</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. Cruz Roja</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. PASMO</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g. Educador de pares o promotores</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>h. Night Club/Bar/Disco</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>i. Gasolinera</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>j. Organización (ONG)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>k. Cual ONG _____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>l. Amigos</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>m. Otro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>n. Especifique _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		SI	NO	a. Supermercado/Tienda	1	2	b. Farmacia	1	2	c. Clínica Privada	1	2	d. Centro de Salud/Hospital	1	2	e. Cruz Roja	1	2	f. PASMO	1	2	g. Educador de pares o promotores	1	2	h. Night Club/Bar/Disco	1	2	i. Gasolinera	1	2	j. Organización (ONG)	1	2	k. Cual ONG _____			l. Amigos	1	2	m. Otro	1	2	n. Especifique _____			
	SI	NO																																														
a. Supermercado/Tienda	1	2																																														
b. Farmacia	1	2																																														
c. Clínica Privada	1	2																																														
d. Centro de Salud/Hospital	1	2																																														
e. Cruz Roja	1	2																																														
f. PASMO	1	2																																														
g. Educador de pares o promotores	1	2																																														
h. Night Club/Bar/Disco	1	2																																														
i. Gasolinera	1	2																																														
j. Organización (ONG)	1	2																																														
k. Cual ONG _____																																																
l. Amigos	1	2																																														
m. Otro	1	2																																														
n. Especifique _____																																																
P502	¿Para usted conseguir un condón es? PUEDE ELEGIR SOLO UNA RESPUESTA LEER RESPUESTAS	[][]	<table> <tr> <td>Muy fácil</td> <td>1</td> <td>→P503</td> </tr> <tr> <td>fácil</td> <td>2</td> <td>→P503</td> </tr> <tr> <td>Difícil</td> <td>4</td> <td>→P504</td> </tr> <tr> <td>Muy difícil</td> <td>5</td> <td>→P504</td> </tr> <tr> <td>No sabe</td> <td>77</td> <td>→P505</td> </tr> <tr> <td>No contesta</td> <td>98</td> <td>→P505</td> </tr> </table>	Muy fácil	1	→P503	fácil	2	→P503	Difícil	4	→P504	Muy difícil	5	→P504	No sabe	77	→P505	No contesta	98	→P505																											
Muy fácil	1	→P503																																														
fácil	2	→P503																																														
Difícil	4	→P504																																														
Muy difícil	5	→P504																																														
No sabe	77	→P505																																														
No contesta	98	→P505																																														
P503	¿Por qué le es fácil conseguir un condón? LEER RESPUESTAS PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	<table> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>a. Me los regalan</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. Son baratos</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Esta cerca el lugar donde compro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. No me da pena</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. Otro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. Especifique _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		SI	NO	a. Me los regalan	1	2	b. Son baratos	1	2	c. Esta cerca el lugar donde compro	1	2	d. No me da pena	1	2	e. Otro	1	2	f. Especifique _____																											
	SI	NO																																														
a. Me los regalan	1	2																																														
b. Son baratos	1	2																																														
c. Esta cerca el lugar donde compro	1	2																																														
d. No me da pena	1	2																																														
e. Otro	1	2																																														
f. Especifique _____																																																
P504	¿Por qué le es difícil conseguir un condón? LEER RESPUESTAS PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	<table> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>a. Me da pena comprar</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. No sé donde conseguirlos</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. No tengo dinero para comprar</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Cuando voy a buscar nunca hay</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. Son muy caros</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. Otro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g. Especifique _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		SI	NO	a. Me da pena comprar	1	2	b. No sé donde conseguirlos	1	2	c. No tengo dinero para comprar	1	2	d. Cuando voy a buscar nunca hay	1	2	e. Son muy caros	1	2	f. Otro	1	2	g. Especifique _____																								
	SI	NO																																														
a. Me da pena comprar	1	2																																														
b. No sé donde conseguirlos	1	2																																														
c. No tengo dinero para comprar	1	2																																														
d. Cuando voy a buscar nunca hay	1	2																																														
e. Son muy caros	1	2																																														
f. Otro	1	2																																														
g. Especifique _____																																																
P505	¿Aproximadamente cuántos condones tiene usted en este momento?	Número de condones disponibles ___ ___ Ninguno 00 No contesta 98																																														

P506	<p>¿En dónde consiguió condones la última vez?</p> <p>PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA</p> <p>MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA</p> <p>MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA</p>	<p>a. Supermercado/Tienda</p> <p>b. Farmacia</p> <p>c. Clínica Privada</p> <p>d. Night Club/Bar/Disco</p> <p>e. Hotel/motel/hospedaje</p> <p>f. PASMO</p> <p>g. En el mismo sitio o negocio de trabajo sexual</p> <p>h. Gasolinera</p> <p>i. Organización (ONG)</p> <p>j. ¿Cuál ONG? _____</p> <p>k. Pro familia</p> <p>k. Otro</p> <p>l. Especifique _____</p>	<p>SI NO</p> <p>1 2</p>	
P507	<p>En la última semana, ¿cuántos condones recibió gratis?</p>	<p>Número gratis _ _ </p> <p>Ninguno 00</p> <p>No contesta 98</p>		
P508	<p>¿Qué lugares o personas conoce donde podría conseguir lubricante?</p> <p>PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA</p> <p>MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA</p> <p>MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA</p>	<p>a. Supermercado/Tienda</p> <p>b. Farmacia</p> <p>c. Clínica Privada</p> <p>d. Centro de Salud/Hospital</p> <p>e. Cruz Roja</p> <p>f. PASMO</p> <p>g. Educador de pares o promotores</p> <p>h. Casa o vivienda</p> <p>i. Gasolinera</p> <p>j. Organización (ONG)</p> <p>k. Cual ONG _____</p> <p>l. Educador de pares o promotores</p> <p>m. Amigos</p> <p>n. Otro</p> <p>o. Especifique _____</p>	<p>SI NO</p> <p>1 2</p>	
P509	<p>¿Para usted conseguir lubricante es?</p> <p>PUEDE ELEGIR SOLO UNA RESPUESTA</p> <p>LEER RESPUESTAS</p>	<p>[_ _]</p>	<p>Muy fácil 1</p> <p>fácil 2</p> <p>Difícil 4</p> <p>Muy difícil 5</p> <p>No responde 98</p>	
P510	<p>¿Qué tipo de lubricantes usa durante las relaciones sexuales?</p> <p>PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA</p> <p>LEER RESPUESTAS</p>	<p>a. No uso</p> <p>b. Lubricante a base de agua</p> <p>c. Vaselina</p> <p>d. Cremas para la piel o de mano</p> <p>e. Gel vaginal</p> <p>f. Aceite de bebé</p> <p>g. Mantequilla</p> <p>h. Aceite de cocinar</p> <p>i. Saliva</p> <p>j. Otro</p> <p>Especificar _____</p>	<p>SI NO</p> <p>1 2</p>	

SECCIÓN 6. SITUACIÓN DE SALUD

En esta sección le voy hacer unas preguntas sobre su situación de salud y la prueba de VIH. Recuerde que sus respuestas se mantendrán confidenciales.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P601	<p>¿Cuándo se enteró de su diagnóstico de VIH cuál fue la razón por la que usted decidió hacerse la prueba de VIH?</p> <p>PUEDE ELEGIR UNA SOLA RESPUESTA</p> <p>LEER RESPUESTAS</p> <p>ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>[][]</p> <p>Voluntario 1</p> <p>Solicitado 2</p> <p>Porque estaba enfermo 3</p> <p>Porque mi pareja fue diagnosticada con VIH o Sida 4</p> <p>Cuando donó sangre 5</p> <p>No contesta 98</p>	
P602	<p>Recibió consejería cuando se realizó la prueba de VIH?</p> <p>PUEDE ELEGIR UNA SOLA RESPUESTA</p> <p>LEER RESPUESTAS</p> <p>ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>[][]</p> <p>Si, la recibí antes de la prueba 1</p> <p>Si, al recibir el resultados de la prueba 2</p> <p>Si, antes y al recibir el resultado 3</p> <p>No recibí consejería 4</p> <p>No contesta 98</p>	
P603	<p>¿Dónde se hizo la prueba de VIH?</p> <p>PUEDE ELEGIR UNA SOLA RESPUESTA</p> <p>LEER RESPUESTAS</p> <p>ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>[][]</p> <p>Centro de salud 1</p> <p>Hospital Público 2</p> <p>Clínica/Laboratorio privado 3</p> <p>En una organización (ONG) 4</p> <p>Escriba el nombre de la ONG _____</p> <p>Banco de sangre 5</p> <p>Cruz Roja 6</p> <p>Otro 7</p> <p>Especifique _____</p> <p>No contesta 98</p>	
<p>Ahora me gustaría hacerle unas preguntas más específicas puede usted decidir no contestarla pero le recuerdo que todas sus respuestas son confidenciales y nos ayudaran mejorar programas para personas a riesgo de VIH.</p>			
P604	<p>¿Hace cuanto tiempo fue diagnosticado (a) con VIH?</p> <p>ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>___ días</p> <p>___ meses</p> <p>___ años</p> <p>No contesta 98</p>	
P605	<p>¿Actualmente está asistiendo a control médico por ser una persona con VIH?</p> <p>ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>[][]</p> <p>Si 1</p> <p>No 2</p> <p>No contesta 98</p>	
P606	<p>¿Cuándo fue la última vez que asistió a su control médico?</p>	<p>___ días</p> <p>___ meses</p> <p>___ años</p> <p>No contesta 98</p>	

<p>P607</p>	<p>¿Qué tipo de servicios recibe cuando asiste a control médico por ser una persona con VIH?</p> <p>PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA</p> <p>LEER RESPUESTAS</p> <p>MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA</p> <p>MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Examen médico</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. Tratamiento antirretroviral</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Tratamiento por enfermedades oportunistas</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Exámenes de laboratorio</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. Exámenes especiales (CD4 y Carga Viral)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. Seguimiento de problemas</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g. Atención en el hogar</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>h. Consejería y educación</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>i. Visitas domiciliarias</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>j. Entrega de víveres/nutrición</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>k. Otro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>l. Especifique_____</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. Examen médico	1	2	b. Tratamiento antirretroviral	1	2	c. Tratamiento por enfermedades oportunistas	1	2	d. Exámenes de laboratorio	1	2	e. Exámenes especiales (CD4 y Carga Viral)	1	2	f. Seguimiento de problemas	1	2	g. Atención en el hogar	1	2	h. Consejería y educación	1	2	i. Visitas domiciliarias	1	2	j. Entrega de víveres/nutrición	1	2	k. Otro	1	2	l. Especifique_____																											
	SI	NO																																																																
a. Examen médico	1	2																																																																
b. Tratamiento antirretroviral	1	2																																																																
c. Tratamiento por enfermedades oportunistas	1	2																																																																
d. Exámenes de laboratorio	1	2																																																																
e. Exámenes especiales (CD4 y Carga Viral)	1	2																																																																
f. Seguimiento de problemas	1	2																																																																
g. Atención en el hogar	1	2																																																																
h. Consejería y educación	1	2																																																																
i. Visitas domiciliarias	1	2																																																																
j. Entrega de víveres/nutrición	1	2																																																																
k. Otro	1	2																																																																
l. Especifique_____																																																																		
<p>P608</p>	<p>¿Considera usted que después de saber que es una persona con VIH, cuida más de su salud?</p> <p>ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>[] []</p> <p>Si 1 No 2 No contesta 98</p>																																																																
<p>P609</p>	<p>¿Qué acciones realiza para cuidar su salud?</p> <p>PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA</p> <p>LEER RESPUESTAS</p> <p>MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA</p> <p>MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. No hace nada</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. Usa condón todas las veces que tiene relaciones sexuales</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Usa condón con las personas que no conoce</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Usa condón solo con su(s) pareja(s) estables(s)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. Usa condón algunas veces</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. No tiene relaciones sexuales con personas desconocidas</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g. No tiene relaciones sexuales vaginales</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>h. No tiene relaciones sexuales anales</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>i. No tiene relaciones sexuales orales</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>j. Practica la abstinencia (no tiene relaciones sexuales de ningún tipo)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>k. Practica la fidelidad mutua con su pareja</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>l. Ha reducido el número de parejas sexuales</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>m. Asiste a las consejerías Asiste a revisiones periódicas de los servicios de salud públicos o privados</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>n. Es miembro de un grupo de auto apoyo</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>o. No consume alcohol</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>p. No consume drogas</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>q. Ha mejorado su alimentación</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>r. Toma los medicamentos que le han recetado</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>s. Otro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>t. Especifique_____</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. No hace nada	1	2	b. Usa condón todas las veces que tiene relaciones sexuales	1	2	c. Usa condón con las personas que no conoce	1	2	d. Usa condón solo con su(s) pareja(s) estables(s)	1	2	e. Usa condón algunas veces	1	2	f. No tiene relaciones sexuales con personas desconocidas	1	2	g. No tiene relaciones sexuales vaginales	1	2	h. No tiene relaciones sexuales anales	1	2	i. No tiene relaciones sexuales orales	1	2	j. Practica la abstinencia (no tiene relaciones sexuales de ningún tipo)	1	2	k. Practica la fidelidad mutua con su pareja	1	2	l. Ha reducido el número de parejas sexuales	1	2	m. Asiste a las consejerías Asiste a revisiones periódicas de los servicios de salud públicos o privados	1	2	n. Es miembro de un grupo de auto apoyo	1	2	o. No consume alcohol	1	2	p. No consume drogas	1	2	q. Ha mejorado su alimentación	1	2	r. Toma los medicamentos que le han recetado	1	2	s. Otro	1	2	t. Especifique_____			
	SI	NO																																																																
a. No hace nada	1	2																																																																
b. Usa condón todas las veces que tiene relaciones sexuales	1	2																																																																
c. Usa condón con las personas que no conoce	1	2																																																																
d. Usa condón solo con su(s) pareja(s) estables(s)	1	2																																																																
e. Usa condón algunas veces	1	2																																																																
f. No tiene relaciones sexuales con personas desconocidas	1	2																																																																
g. No tiene relaciones sexuales vaginales	1	2																																																																
h. No tiene relaciones sexuales anales	1	2																																																																
i. No tiene relaciones sexuales orales	1	2																																																																
j. Practica la abstinencia (no tiene relaciones sexuales de ningún tipo)	1	2																																																																
k. Practica la fidelidad mutua con su pareja	1	2																																																																
l. Ha reducido el número de parejas sexuales	1	2																																																																
m. Asiste a las consejerías Asiste a revisiones periódicas de los servicios de salud públicos o privados	1	2																																																																
n. Es miembro de un grupo de auto apoyo	1	2																																																																
o. No consume alcohol	1	2																																																																
p. No consume drogas	1	2																																																																
q. Ha mejorado su alimentación	1	2																																																																
r. Toma los medicamentos que le han recetado	1	2																																																																
s. Otro	1	2																																																																
t. Especifique_____																																																																		

P610	¿Qué lo motivó a tomar acciones para cuidar su salud? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA LEER RESPUESTAS MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> <td style="text-align: right;">NO</td> </tr> <tr> <td>a. Nada me motiva</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>b. Los mensajes de la radio</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>c. Los mensajes de la televisión</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>d. Información escrita que ha leído</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>e. Las conversaciones con amigos(as)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>f. Las charlas recibidas de ONG´S</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>g. Sus creencias religiosas</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>h. La muerte de una persona cercana</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>i. Amor a sus hijos, familiares y/o pareja</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>j. Amor propio, autoestima</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>k. Asistir a los grupos de auto apoyo</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>l. Quiero vivir</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>m. Programa de visita domiciliar</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>n. Otro</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>o. Especifique_____</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		SI	NO	a. Nada me motiva	1	2	b. Los mensajes de la radio	1	2	c. Los mensajes de la televisión	1	2	d. Información escrita que ha leído	1	2	e. Las conversaciones con amigos(as)	1	2	f. Las charlas recibidas de ONG´S	1	2	g. Sus creencias religiosas	1	2	h. La muerte de una persona cercana	1	2	i. Amor a sus hijos, familiares y/o pareja	1	2	j. Amor propio, autoestima	1	2	k. Asistir a los grupos de auto apoyo	1	2	l. Quiero vivir	1	2	m. Programa de visita domiciliar	1	2	n. Otro	1	2	o. Especifique_____			
	SI	NO																																																	
a. Nada me motiva	1	2																																																	
b. Los mensajes de la radio	1	2																																																	
c. Los mensajes de la televisión	1	2																																																	
d. Información escrita que ha leído	1	2																																																	
e. Las conversaciones con amigos(as)	1	2																																																	
f. Las charlas recibidas de ONG´S	1	2																																																	
g. Sus creencias religiosas	1	2																																																	
h. La muerte de una persona cercana	1	2																																																	
i. Amor a sus hijos, familiares y/o pareja	1	2																																																	
j. Amor propio, autoestima	1	2																																																	
k. Asistir a los grupos de auto apoyo	1	2																																																	
l. Quiero vivir	1	2																																																	
m. Programa de visita domiciliar	1	2																																																	
n. Otro	1	2																																																	
o. Especifique_____																																																			
P611	¿Ha tenido algún problema de salud o infección en los últimos 3 meses? ANOTE LA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">[] []</td> <td style="text-align: right;">Si 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">No 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">No sabe 77</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">No contesta 98</td> </tr> </table>	[] []	Si 1		No 2		No sabe 77		No contesta 98																																									
[] []	Si 1																																																		
	No 2																																																		
	No sabe 77																																																		
	No contesta 98																																																		
P612	¿En los últimos tres meses ha presentado... LEER RESPUESTAS PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Si</td> <td style="text-align: right;">No</td> </tr> <tr> <td>a. Fiebre prolongada</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>b. Diarrea</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>c. Depresión</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>d. Tos</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>e. Abscesos en la piel</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>f. Herpes</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>g. Ganglios inflamados</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>h. Enfermedades de la piel</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>i. Convulsiones</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>j. Dolor de cabeza persistente</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>k. Candidiasis oral</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>l. Neumonía</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>m. Tuberculosis</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>n. Otro</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>o. Especifique_____</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Si	No	a. Fiebre prolongada	1	2	b. Diarrea	1	2	c. Depresión	1	2	d. Tos	1	2	e. Abscesos en la piel	1	2	f. Herpes	1	2	g. Ganglios inflamados	1	2	h. Enfermedades de la piel	1	2	i. Convulsiones	1	2	j. Dolor de cabeza persistente	1	2	k. Candidiasis oral	1	2	l. Neumonía	1	2	m. Tuberculosis	1	2	n. Otro	1	2	o. Especifique_____			Si contest a NO en todas las respuestas →P619
	Si	No																																																	
a. Fiebre prolongada	1	2																																																	
b. Diarrea	1	2																																																	
c. Depresión	1	2																																																	
d. Tos	1	2																																																	
e. Abscesos en la piel	1	2																																																	
f. Herpes	1	2																																																	
g. Ganglios inflamados	1	2																																																	
h. Enfermedades de la piel	1	2																																																	
i. Convulsiones	1	2																																																	
j. Dolor de cabeza persistente	1	2																																																	
k. Candidiasis oral	1	2																																																	
l. Neumonía	1	2																																																	
m. Tuberculosis	1	2																																																	
n. Otro	1	2																																																	
o. Especifique_____																																																			

P613	¿La última vez que presentó estos problemas de salud que hizo usted? PUEDA ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA LEER RESPUESTAS MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">SI</th> <th style="text-align: right;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. No hice nada</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>b. Consultó en el servicio de salud donde asiste a control</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>c. Consultó a otro médico particular</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>d. Le recetaron medicamentos</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>e. Tomó los medicamentos que le indicaron</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>f. No le entregaron ninguno de los medicamentos en el servicio de salud donde asiste a control</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>g. Tuvo que comprar algunos o todos los medicamentos</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>h. El servicio de salud le entregó unos medicamentos, no todos</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>i. Otro</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>j. Especifique _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. No hice nada	1	2	b. Consultó en el servicio de salud donde asiste a control	1	2	c. Consultó a otro médico particular	1	2	d. Le recetaron medicamentos	1	2	e. Tomó los medicamentos que le indicaron	1	2	f. No le entregaron ninguno de los medicamentos en el servicio de salud donde asiste a control	1	2	g. Tuvo que comprar algunos o todos los medicamentos	1	2	h. El servicio de salud le entregó unos medicamentos, no todos	1	2	i. Otro	1	2	j. Especifique _____			
	SI	NO																																		
a. No hice nada	1	2																																		
b. Consultó en el servicio de salud donde asiste a control	1	2																																		
c. Consultó a otro médico particular	1	2																																		
d. Le recetaron medicamentos	1	2																																		
e. Tomó los medicamentos que le indicaron	1	2																																		
f. No le entregaron ninguno de los medicamentos en el servicio de salud donde asiste a control	1	2																																		
g. Tuvo que comprar algunos o todos los medicamentos	1	2																																		
h. El servicio de salud le entregó unos medicamentos, no todos	1	2																																		
i. Otro	1	2																																		
j. Especifique _____																																				
P614	¿Cuánto tiempo después que le aparecieron los primeros síntomas buscó ayuda en un centro de salud, clínica, hospital, u ONG? ANOTE SOLO UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>[] [] Una semana o menos</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Más de una semana, pero menos de un mes</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Un mes o más</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Me lo detectaron en la consulta</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>No busque ayuda</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>No sabe</td> <td style="text-align: right;">77</td> </tr> <tr> <td>No contesta</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> </tbody> </table>	[] [] Una semana o menos	1	Más de una semana, pero menos de un mes	2	Un mes o más	3	Me lo detectaron en la consulta	4	No busque ayuda	5	No sabe	77	No contesta	98	→P619 →P619 →P619																			
[] [] Una semana o menos	1																																			
Más de una semana, pero menos de un mes	2																																			
Un mes o más	3																																			
Me lo detectaron en la consulta	4																																			
No busque ayuda	5																																			
No sabe	77																																			
No contesta	98																																			
P615	¿Recibió una(s) receta(s) para la medicina? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>[] [] Si</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>No contesta</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> </tbody> </table>	[] [] Si	1	No	2	No contesta	98	→P619 →P619																											
[] [] Si	1																																			
No	2																																			
No contesta	98																																			
P616	¿Consiguió la medicina recetada? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>[] [] Sí, conseguí todo lo que necesitaba</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Conseguí algunas pero no todas</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>No conseguí la medicina</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>No contesta</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> </tbody> </table>	[] [] Sí, conseguí todo lo que necesitaba	1	Conseguí algunas pero no todas	2	No conseguí la medicina	3	No contesta	98	→P619 →P619																									
[] [] Sí, conseguí todo lo que necesitaba	1																																			
Conseguí algunas pero no todas	2																																			
No conseguí la medicina	3																																			
No contesta	98																																			
P617	¿Tomó o se aplicó toda la medicina que le recetaron? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>[] [] Si</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>No contesta</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> </tbody> </table>	[] [] Si	1	No	2	No contesta	98	→P619																											
[] [] Si	1																																			
No	2																																			
No contesta	98																																			
P618	¿Por qué no se tomó toda la medicina que le recetaron? PUEDA ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA RESPUESTAS ESPONTÁNEAS NO LEER RESPUESTAS INDAGAR “¿HIZO OTRA COSA?” Y ANOTAR	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">SI</th> <th style="text-align: right;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Los síntomas desaparecieron</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>b. Me sentía mejor</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>c. La medicina me cayó mal, me enfermó</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>d. No estaba segura cómo se “tomaba”</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>e. No tenía dinero para el medicamento</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>f. Se me olvidó</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. Los síntomas desaparecieron	1	2	b. Me sentía mejor	1	2	c. La medicina me cayó mal, me enfermó	1	2	d. No estaba segura cómo se “tomaba”	1	2	e. No tenía dinero para el medicamento	1	2	f. Se me olvidó	1	2													
	SI	NO																																		
a. Los síntomas desaparecieron	1	2																																		
b. Me sentía mejor	1	2																																		
c. La medicina me cayó mal, me enfermó	1	2																																		
d. No estaba segura cómo se “tomaba”	1	2																																		
e. No tenía dinero para el medicamento	1	2																																		
f. Se me olvidó	1	2																																		
P619	¿Usted diría que su estado de salud actual es? LEER RESPUESTAS ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>[] [] Muy bueno</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Estable</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>No contesta</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> </tbody> </table>	[] [] Muy bueno	1	Bueno	2	Estable	3	Regular	4	Malo	5	No contesta	98																						
[] [] Muy bueno	1																																			
Bueno	2																																			
Estable	3																																			
Regular	4																																			
Malo	5																																			
No contesta	98																																			

P620	¿De qué manera le proporciona el servicio de salud sus medicamentos antirretrovirales? LEER RESPUESTAS ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Completa y gratuita 1 Solo completa 2 Solo gratuita 3 No contesta 98																																		
P621	¿Ha pagado por atención médica integral (laboratorio, medicamento, consultas) durante los últimos 12 meses?	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98																																		
P622	¿Quién le apoya con los gastos médicos? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA LEER RESPUESTAS MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA		<table> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Seguro social</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. El Hospital /sitio de control paga una parte</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Familiares</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Pareja</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. Amigos /conocidos</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. Grupo de auto apoyo VIH/sida</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g. Organización (ONG) Cuál ONG _____</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>h. Yo cubro la mayoría de los gastos médicos</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>i. No gasta</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>j. Otro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> Especifique _____ No contesta 98		SI	NO	a. Seguro social	1	2	b. El Hospital /sitio de control paga una parte	1	2	c. Familiares	1	2	d. Pareja	1	2	e. Amigos /conocidos	1	2	f. Grupo de auto apoyo VIH/sida	1	2	g. Organización (ONG) Cuál ONG _____	1	2	h. Yo cubro la mayoría de los gastos médicos	1	2	i. No gasta	1	2	j. Otro	1	2	
	SI	NO																																			
a. Seguro social	1	2																																			
b. El Hospital /sitio de control paga una parte	1	2																																			
c. Familiares	1	2																																			
d. Pareja	1	2																																			
e. Amigos /conocidos	1	2																																			
f. Grupo de auto apoyo VIH/sida	1	2																																			
g. Organización (ONG) Cuál ONG _____	1	2																																			
h. Yo cubro la mayoría de los gastos médicos	1	2																																			
i. No gasta	1	2																																			
j. Otro	1	2																																			
P623	¿Actualmente está tomando antirretrovirales? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98	→P631																																	
P624	¿Hace cuanto tiempo empezó a tomar medicamentos antirretrovirales?		___ días ___ meses ___ años No contesta 98																																		
P625	¿Quién le brinda la atención en su control por terapia antirretroviral? LEER RESPUESTAS PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA		<table> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Médico especialista</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. Médico general</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Enfermera</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Consejera</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. Otro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. Especifique _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. Médico especialista	1	2	b. Médico general	1	2	c. Enfermera	1	2	d. Consejera	1	2	e. Otro	1	2	f. Especifique _____															
	SI	NO																																			
a. Médico especialista	1	2																																			
b. Médico general	1	2																																			
c. Enfermera	1	2																																			
d. Consejera	1	2																																			
e. Otro	1	2																																			
f. Especifique _____																																					
P626	¿Conoce que medicamentos antirretrovirales está tomando? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98																																		
P627	¿Ha tenido efectos adversos producidos por la terapia antirretroviral? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Si 1 No 2 No contesta 98	→P629																																	

P628	¿Qué hizo usted cuando se presentaron efectos adversos por la terapia antirretroviral? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA LEER RESPUESTAS MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Le cambiaron el esquema de tratamiento antirretroviral</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. Consultó a su médico en el servicio de salud</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Consultó a otro medico particular</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Suspendió la terapia sin consultar con nadie</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. No suspendió la terapia</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. Siguió las indicaciones de su médico en el servicio de salud</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g. Acudió a la ONG</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>h. Acudió a un amigo o pariente</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>i. Acudió al educador o consejero del servicio de salud</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>j. No hizo nada</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>k. Otros</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>l. Especifique _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. Le cambiaron el esquema de tratamiento antirretroviral	1	2	b. Consultó a su médico en el servicio de salud	1	2	c. Consultó a otro medico particular	1	2	d. Suspendió la terapia sin consultar con nadie	1	2	e. No suspendió la terapia	1	2	f. Siguió las indicaciones de su médico en el servicio de salud	1	2	g. Acudió a la ONG	1	2	h. Acudió a un amigo o pariente	1	2	i. Acudió al educador o consejero del servicio de salud	1	2	j. No hizo nada	1	2	k. Otros	1	2	l. Especifique _____			
	SI	NO																																								
a. Le cambiaron el esquema de tratamiento antirretroviral	1	2																																								
b. Consultó a su médico en el servicio de salud	1	2																																								
c. Consultó a otro medico particular	1	2																																								
d. Suspendió la terapia sin consultar con nadie	1	2																																								
e. No suspendió la terapia	1	2																																								
f. Siguió las indicaciones de su médico en el servicio de salud	1	2																																								
g. Acudió a la ONG	1	2																																								
h. Acudió a un amigo o pariente	1	2																																								
i. Acudió al educador o consejero del servicio de salud	1	2																																								
j. No hizo nada	1	2																																								
k. Otros	1	2																																								
l. Especifique _____																																										
P629	¿Desde que comenzó con su terapia antirretroviral, alguna vez la ha suspendido por indicación propia? Es decir por su propia voluntad y no por prescripción médica. ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tr> <td>[] []</td> <td>Si 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No contesta 98</td> </tr> </table>	[] []	Si 1		No 2		No contesta 98	→P631																																	
[] []	Si 1																																									
	No 2																																									
	No contesta 98																																									
P630	¿Cuáles son las razones por las que usted ha faltado en tomar su medicamento? LEER RESPUESTAS PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Por el costo</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. Porque no hay (escasez)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Causan efectos secundarios</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Es difícil recordar</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. Es difícil / complicado tomarlo</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. He faltado a mis citas médicas</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g. Otro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>h. Especifique _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. Por el costo	1	2	b. Porque no hay (escasez)	1	2	c. Causan efectos secundarios	1	2	d. Es difícil recordar	1	2	e. Es difícil / complicado tomarlo	1	2	f. He faltado a mis citas médicas	1	2	g. Otro	1	2	h. Especifique _____															
	SI	NO																																								
a. Por el costo	1	2																																								
b. Porque no hay (escasez)	1	2																																								
c. Causan efectos secundarios	1	2																																								
d. Es difícil recordar	1	2																																								
e. Es difícil / complicado tomarlo	1	2																																								
f. He faltado a mis citas médicas	1	2																																								
g. Otro	1	2																																								
h. Especifique _____																																										
P631	¿Qué efectos tiene en una persona con VIH tomar medicamentos antirretrovirales? LEER RESPUESTAS PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Se enferma menos</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b. Vive más tiempo</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c. Menos probabilidad de transmitir VIH</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d. Se enferma mas</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e. Muere mas rápido</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f. Ningún efecto</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g. Otro</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. Se enferma menos	1	2	b. Vive más tiempo	1	2	c. Menos probabilidad de transmitir VIH	1	2	d. Se enferma mas	1	2	e. Muere mas rápido	1	2	f. Ningún efecto	1	2	g. Otro	1	2																
	SI	NO																																								
a. Se enferma menos	1	2																																								
b. Vive más tiempo	1	2																																								
c. Menos probabilidad de transmitir VIH	1	2																																								
d. Se enferma mas	1	2																																								
e. Muere mas rápido	1	2																																								
f. Ningún efecto	1	2																																								
g. Otro	1	2																																								
P632	¿Se ha realizado el examen de CD4? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tr> <td>[] []</td> <td>Si 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No contesta 98</td> </tr> </table>	[] []	Si 1		No 2		No contesta 98	→P635																																	
[] []	Si 1																																									
	No 2																																									
	No contesta 98																																									
P633	¿Conoce los resultados de su último examen de CD4? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tr> <td>[] []</td> <td>Si 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No contesta 98</td> </tr> </table>	[] []	Si 1		No 2		No contesta 98																																		
[] []	Si 1																																									
	No 2																																									
	No contesta 98																																									
P634	¿Cuándo fue la última vez que se realizó este estudio (examen de CD4)? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>___ días</td> </tr> <tr> <td></td> <td>___ meses</td> </tr> <tr> <td></td> <td>___ años</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No contesta 98</td> </tr> </table>		___ días		___ meses		___ años		No contesta 98																																
	___ días																																									
	___ meses																																									
	___ años																																									
	No contesta 98																																									

P635	¿Se ha realizado el examen de carga viral? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][]	Si 1 No 2 No contesta 98	→638
P636	¿Conoce los resultados de su último examen de carga viral? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][]	Si 1 No 2 No contesta 98	
P637	¿Cuándo fue la última vez que se realizó el examen de carga viral? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA		___ días ___ meses ___ años No contesta 98	
P638	Después de saber que usted es una persona con VIH ¿Ha recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][]	Si 1 No 2 No contesta 98	
P639	Siendo usted una persona con VIH ¿Se ha enfermado de tuberculosis? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][]	Si 1 No 2 No contesta 98	
P640	Siendo usted una persona con VIH ¿Ha recibido tratamiento para curar la tuberculosis? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][]	Si 1 No 2 No contesta 98	

SECCIÓN 7. DISCRIMINACIÓN, ESTIGMA, APOYO Y DERECHOS

Por discriminación entendemos los posibles maltratos, físicos o verbales que puede sufrir una persona con VIH en cualquier área de su vida cotidiana o al solicitar servicios a los que tiene derecho. Es necesario enfatizarle que mucha gente recibe algún tipo de maltrato en su trabajo, escuela, familia o al solicitar o recibir algún servicio. Le pedimos que se esfuerce para referir si, en su caso, ha vivido alguna situación discriminatoria o de maltrato debido exclusivamente, a su condición de persona con VIH. Recuerde que sus respuestas se mantendrán confidenciales.

No.	Preguntas y filtros	Códigos de categorías	Ir a
P701	¿Ha sufrido algún tipo de discriminación, abuso o maltrato por ser persona con VIH? Discriminación: es la acción que hace diferencias, distinción, separación y aislamiento. Por abuso o maltrato no referimos a golpes, puñetazos, patadas, amenazas, regaños, o humillaciones	[][] Sí 1 No 2 No contesta 98	→P704 →P704

<p>P702</p>	<p>¿Cuál fue el tipo de discriminación, abuso o maltrato que sufrió por ser una persona con VIH?</p> <p>PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA LEER RESPUESTAS</p> <p>MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA</p> <p>MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SI</th> <th style="text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Aislamiento por amigos y/o familiares</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>b. Abstención de contacto físico</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>c. Expulsión del trabajo</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>d. Expulsión de la casa</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>e. Malos tratos en los servicios de salud</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>f. Divulgación de su condición de VIH</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>g. Rechazo en el vecindario</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>h. Rechazo por otros</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>i. Otro</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>j. Especifique _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. Aislamiento por amigos y/o familiares	1	2	b. Abstención de contacto físico	1	2	c. Expulsión del trabajo	1	2	d. Expulsión de la casa	1	2	e. Malos tratos en los servicios de salud	1	2	f. Divulgación de su condición de VIH	1	2	g. Rechazo en el vecindario	1	2	h. Rechazo por otros	1	2	i. Otro	1	2	j. Especifique _____						
	SI	NO																																					
a. Aislamiento por amigos y/o familiares	1	2																																					
b. Abstención de contacto físico	1	2																																					
c. Expulsión del trabajo	1	2																																					
d. Expulsión de la casa	1	2																																					
e. Malos tratos en los servicios de salud	1	2																																					
f. Divulgación de su condición de VIH	1	2																																					
g. Rechazo en el vecindario	1	2																																					
h. Rechazo por otros	1	2																																					
i. Otro	1	2																																					
j. Especifique _____																																							
<p>P703</p>	<p>¿Quién le discriminó, maltrató o abusó a usted?</p> <p>PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA LEER RESPUESTAS</p> <p>MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA</p> <p>MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SI</th> <th style="text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Familia</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>b. Amigos</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>c. Pareja</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>d. Patrones o jefes</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>e. Otras personas infectadas con VIH</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>f. Personal de salud</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>g. Personas del municipio</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>h. Compañeros de trabajo</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>i. Desconocido</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>j. Otros</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>k. Especifique _____</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	a. Familia	1	2	b. Amigos	1	2	c. Pareja	1	2	d. Patrones o jefes	1	2	e. Otras personas infectadas con VIH	1	2	f. Personal de salud	1	2	g. Personas del municipio	1	2	h. Compañeros de trabajo	1	2	i. Desconocido	1	2	j. Otros	1	2	k. Especifique _____			
	SI	NO																																					
a. Familia	1	2																																					
b. Amigos	1	2																																					
c. Pareja	1	2																																					
d. Patrones o jefes	1	2																																					
e. Otras personas infectadas con VIH	1	2																																					
f. Personal de salud	1	2																																					
g. Personas del municipio	1	2																																					
h. Compañeros de trabajo	1	2																																					
i. Desconocido	1	2																																					
j. Otros	1	2																																					
k. Especifique _____																																							
<p>P704</p>	<p>¿Alguna vez ha sido víctima de algún tipo de maltrato en los servicios de salud por ser una persona con VIH?</p> <p>ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<table border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">[] []</td> <td style="text-align: right;">Sí 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">No 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">No contesta 98</td> </tr> </tbody> </table>	[] []	Sí 1		No 2		No contesta 98																															
[] []	Sí 1																																						
	No 2																																						
	No contesta 98																																						
<p>P705</p>	<p>Cuando recibe servicios médicos, ¿Considera necesario ocultar que usted es una persona con VIH?</p> <p>ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<table border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">[] []</td> <td style="text-align: right;">Sí 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">No 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">No contesta 98</td> </tr> </tbody> </table>	[] []	Sí 1		No 2		No contesta 98																															
[] []	Sí 1																																						
	No 2																																						
	No contesta 98																																						

P710	¿Cómo ha sido el rechazo que recibió de su familia? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	a. La excluyeron de convivencias familiares b. Ha tenido que cambiar de domicilio c. Violencia física contra usted d. Violencia sexual contra usted e. Violencia verbal contra usted f. Otra g. Especifique_____	SI 1 1 1 1 1 1 1	NO 2 2 2 2 2 2 2	
P711	Actualmente, ¿recibe apoyo de alguno de sus familiares? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Sí 1 No 2 No contesta 98		
P712	Si alguna vez buscó trabajo, ¿tuvo necesidad de ocultar que es una persona con VIH? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Sí 1 No 2 No busqué empleo 3 No contesta 98		
P713	¿Tiene a alguien que le ayude en caso de que necesite dinero? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Sí 1 No 2 No contesta 98		
P714	¿Tiene a alguien que le pueda acompañar al servicio de salud o al hospital, en caso que lo necesite? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Sí 1 No 2 No contesta 98		
P715	¿Conoce si existe alguna ley que proteja a las personas con VIH? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98		
P716	¿Denunciaría usted un acto de violación a sus derechos? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98		→P801
P717	¿Por qué no denunciaría usted un acto de violación a sus derechos? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA LEER RESPUESTAS	a. No cambiaría nada con hacerlo b. Se darían cuenta que soy una persona con VIH c. Para proteger a mi familia d. No sabe cómo hacerlo e. No tiene tiempo f. Otro g. Especifique_____	SI 1 1 1 1 1 1 1	NO 2 2 2 2 2 2 2	

SECCIÓN 8. USO DE ALCOHOL Y DROGAS

Ahora le voy hacer unas preguntas sobre uso de alcohol y drogas recuerde que sus respuestas se mantienen confidenciales.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P801	¿Usted ha tomado alcohol o licor durante el último mes? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	→P803 →P803
P802	Durante el último mes, en promedio ¿Cuántas copas consumió a la semana?	Número de copas [][][] Ninguna 00 No contesta 98	
P803	Algunas personas han probado diferentes drogas como la marihuana, cocaína, heroína, piedra y otras. ¿Usted alguna vez ha probado drogas? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA Excluir sustancias/ medicamentos con fines médicos o de tratamiento	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	→P806 →P806
P804	En el último año ¿usted ha...? Nos referimos a aquellos que no sean medicamento con fines médicos o de tratamiento) LEER RESPUESTAS PUEDA ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA	SI NO a. ¿Fumado Marihuana? 1 2 b. ¿Fumado piedra o crack? 1 2 c. ¿Inhalado piedra o crack? 1 2 d. ¿Inhalado cocaína? 1 2 e. ¿Inyectado cocaína? 1 2 f. ¿Inyectado heroína? 1 2 g. ¿Inhalado thiner o resistol? 1 2 h. ¿Consumido éxtasis? 1 2 i. ¿Tomado anfetaminas? 1 2 j. ¿Tomado diazepam? 1 2 k. ¿Usado otra droga? 1 2 Especifique _____	NO →P806
P805	Durante el último mes ¿Cuántas veces usó alguna droga? Excluir medicamentos con fines médicos o de tratamiento	Número de veces _____ Ninguna 00 No contesta 98	
P806	¿Alguna vez se ha inyectado droga? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA Excluir sustancias/ medicamentos con fines médicos o de tratamiento	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	→ P901 → P901
P807	Cuando se ha inyectado droga, ¿otra persona se inyectó antes o después de usted con la jeringa, aguja, u otro equipo de inyección que usted usó? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	

SECCIÓN 9. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS ESTABLES

A continuación le haremos unas preguntas sobre las relaciones sexuales con parejas estables y última relación sexual. Recuerde que en todas sus respuestas mantendremos la confidencialidad.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P901	¿Actualmente tiene pareja estable? Pareja estable: son personas con las que tuvo relaciones sexuales que no le pagaron y que mantiene una relación afectiva/constante/regular/ por ejemplo su conyugue, novio o marido, aunque no vivan en la misma casa.	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	→P1001 →P1001
P902	¿Su pareja estable es una persona con VIH? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Sí 1 No 2 No tengo pareja estable 3 No contesta 98	
P903	¿Qué edad tiene su pareja estable?	Edad en años _____ No sabe 77 No contesta 98	
P904	¿Su pareja estable sabe que usted es una persona con VIH? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Sí 1 No 2 No tengo pareja estable 3 No contesta 98	
P905	La última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja estable ¿usaron un condón? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	→P907 →P907
P906	¿Quién propuso el uso de condón en esa oportunidad? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Yo misma (o) 1 Mi pareja 2 Decisión conjunta 3 No contesta 98	→P908 →P908 →P908
P907	¿Por qué no usaron un condón usted y su pareja sexual estable la última vez que tuvieron relaciones sexuales? PUEDA ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	SI NO a. Confío en mi pareja 1 2 b. Está sano 1 2 c. Mi pareja no quiso usar 1 2 d. Yo no quise usar 1 2 e. Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas 1 2 f. No tenía un condón en ese momento 1 2 g. Los condones son muy caros 1 2 h. Los condones no funcionan 1 2 i. Otra 1 2 j. Especifique _____	
P908	La última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja estable con un condón, ¿usaron lubricante todo el tiempo de la penetración? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No uso lubricante con mi pareja estable 3 No contesta 98	
P909	¿En el último año, con qué frecuencia uso usted condones con su pareja sexual estable? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Siempre 1 Algunas veces 2 Nunca 3 No contesta 98	

P910	¿En el último mes, con qué frecuencia uso usted lubricante con su pareja sexual estable? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] []	Siempre	1	
			Algunas veces	2	
			Nunca	3	
			No contesta	98	

SECCIÓN 10. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS OCASIONALES

A continuación le haremos unas preguntas sobre las relaciones sexuales con parejas ocasionales. Recuerde que en todas sus respuestas mantendremos la confidencialidad.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P1001	En el último año ¿Ha tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales? Parejas ocasionales: son personas con las que tuvo relaciones sexuales que no le pagaron y que no mantiene una relación estable/constante/afectiva ó regular.	[] [] Si 1 No 2 No contesta 98	→P1201 →P1201
P1002	La última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja ocasional ¿usaron un condón? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Si 1 No 2 No contesta 98	→P1104
P1003	¿Quién propuso el uso de condón en esa oportunidad? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Yo misma 1 La persona 2 Decisión conjunta 3 No contesta 98	
P1004	¿Por qué no usaron un condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	SI NO a. Confío en mi pareja 1 2 b. Está sano 1 2 c. Mi pareja no quiso usar 1 2 d. Yo no quise usar 1 2 e. Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas 1 2 f. No tenía un condón 1 2 g. Los condones son muy caros 1 2 h. Los condones no funcionan 1 2 i. Otra 1 2 j. Especifique_____	
P1005	La última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja ocasional ¿usaron lubricante todo el tiempo de la penetración? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Si 1 No 2 No contesta 98	
P1006	Piense en sus relaciones sexuales con parejas ocasionales, ¿con qué frecuencia usa condón? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Siempre 1 Algunas veces 2 Nunca 3 No he tenido pareja ocasional 4 No contesta 98	
P1007	¿La última pareja ocasional con la que tuvo relaciones sexuales tiene el VIH? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	

SECCIÓN 11. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS COMERCIALES

A continuación le haremos unas preguntas sobre las relaciones sexuales con parejas **comerciales**, en todas sus respuestas mantendremos la confidencialidad.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P1101	En el último año ¿Ha tenido relaciones sexuales con parejas comerciales? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA Pareja comercial: Es aquella persona a la que usted le pagó para tener relaciones sexuales.	[] [] Si 1 No 2 No contesta 98	→P1201 →P1201
P1102	La última vez que pagó por tener relaciones sexuales, ¿dónde fue? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] En la ciudad donde vivo 1 En otra ciudad 2 En otro país 3 No contesta 98	
P1103	En el último año, ¿qué servicio sexual ha comprado? PUED ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA MARCAR 1 SI LA PERSONA MENCIONÓ LA RESPUESTA MARCAR 2 SI LA PERSONA NO MENCIONÓ LA RESPUESTA	SI NO a. Sexo anal 1 2 b. Sexo vaginal 1 2 c. Sexo oral 1 2 d. Masturbación 1 2 e. Otro 1 2 f. Especifique_____	
P1104	La última vez que pagó para tener relaciones sexuales, ¿utilizaron un condón? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Si 1 No 2 No contesta 98	
P1105	Durante el último año, ¿Con qué frecuencia utilizó usted condones todas las veces que pagó por tener relaciones sexuales? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Siempre 1 Algunas veces 2 Nunca 3 No he pagado por sexo 4 No contesta 98	
P1106	La última vez que pagó para tener relaciones sexuales, ¿utilizaron lubricante durante la penetración? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Si 1 No 2 No contesta 98	
P1107	¿En el último año, usted ha pagado por tener relaciones sexuales con...? PUED ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA	SI NO a. Hombres 1 2 b. Mujeres 1 2 c. Trans 1 2	
P1108	¿Usted le dice a los trabajadores (as) sexuales que es una persona con VIH? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Si 1 No 2 No contesta 98	
P1109	De las personas con las que ha tenido sexo pagado ¿sabe usted si alguna tenía VIH? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[] [] Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98	

SECCION 12. ULTIMA REALCIÓN SEXUAL

Ahora le voy hacer unas preguntas sobre la última relación sexual.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P1201	<p>Piense en su última relación sexual ¿Con que tipo de pareja tuvo la última relación sexual?</p> <p>La última relación sexual. Es la última vez que tuvo relaciones sexuales, con la pareja estable, con una pareja ocasional, pareja comercial o con cliente.</p> <p>ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA LEER RESPUESTAS</p>	<p>[][]</p> <p>Pareja estable, vive con ella 1 Pareja estable, no vive con ella 2 Cliente 3 Pareja ocasional 4 Pareja comercial 5 Desconocido 6 No contesta 98</p>	
P1202	<p>Esa última vez que tuvo relaciones sexuales ¿utilizaron un condón?</p> <p>ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>[][]</p> <p>Si 1 No 2 No contesta 98</p>	<p>→P1205 →P1205</p>
P1203	<p>¿Quién sugirió el uso del condón en esa última relación sexual?</p> <p>ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>[][]</p> <p>Yo misma (o) 1 La otra persona 2 Decisión conjunta 3 No contesta 98</p>	
P1204	<p>¿Por qué no usaron un condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales?</p> <p>PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA</p>	<p>SI NO</p> <p>a. Confío en mi pareja 1 2 b. Está sano 1 2 c. Mi pareja no quiso usar 1 2 d. Yo no quise usar 1 2 e. Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas 1 2 f. No tenía un condón en ese momento 1 2 g. Los condones son muy caros 1 2 h. Los condones no funcionan 1 2 i. Otra j. Especifique_____</p>	
P1205	<p>Esta última vez que tuvo relaciones sexuales ¿usó lubricante todo el tiempo de la penetración?</p> <p>ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>[][]</p> <p>Si 1 No 2 Nunca uso lubricante 3 No contesta 98</p>	
P1206	<p>Entonces tomando en cuenta todas sus parejas sexuales, durante el último mes...</p> <p>a. ¿alguna vez ha tenido relaciones sexuales sin usar un condón?</p> <p>b. ¿alguna vez ha tenido relaciones anales (ha sido penetrado/a por detrás) sin que usaran un condón?</p> <p>c. ¿algún hombre se vino o eyaculó en su boca sin usar condón?</p> <p>d. ¿Usó lubricante en todas sus relaciones sexuales?</p>	<p>Si No</p> <p>1 2 1 2 1 2 1 2</p>	
P1207	<p>¿Esta pareja, con quien tuvo relaciones sexuales la ultima vez, es una persona con VIH?</p> <p>ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA</p>	<p>[][]</p> <p>Si 1 No 2 No sabe 77 No contesta 98</p>	

SECCIÓN 13. TRABAJO SEXUAL

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas personales sobre trabajo sexual.
 Recuerde que sus respuestas se mantendrán confidenciales.

No.	Preguntas	Categorías de codificación	Pase a
P1301	En los últimos 12 meses ¿ha recibido dinero a cambio de tener relaciones sexuales?	[][] SI 1 No 2 No contesta 98	
P1302	¿Actualmente se dedica usted al trabajo sexual? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] SI 1 No 2 No contesta 98	→ Fin de la entrevista
P1303	¿Cuántos años tenía, la primera vez que recibió dinero por tener relaciones sexuales?	Años [][] No contesta 98	
P1304	¿Por su trabajo sexual, usted como se identifica? Trabajo sexual es el tener relaciones sexuales con hombres o mujeres a cambio de dinero ESPERE UNA RESPUESTA ESPONTÁNEA Y SI NO SE OBTIENE UNA RESPUESTA ESPERADA LEER LAS RESPUESTAS	[][] Trabajador(a) sexual 1 Masajista/fichera/mesera(o)/bailarín(a), pero algunas veces hago entradas 2 Ama de casa, pero algunas veces hago entradas 3 Estudiante, pero algunas veces hago entradas 4 Otro 5 Especifique _____ No contesta 98	
P1305	¿Le dice usted a sus clientes que tiene VIH? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	
P1306	Durante el último año ¿ha estado en otras ciudades para hacer trabajo sexual? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	
P1307	Durante el último año ¿ha estado en otro país para hacer trabajo sexual? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	
P1308	Durante el último año ¿cuál ha sido su lugar principal de trabajo sexual, es decir el lugar donde consigue su cliente más seguido? LEER RESPUESTAS SOLO PUEDE ELEGIR UNA RESPUESTA ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Burdel / negocio 1 Casa de citas 2 Carretera / Calle / parque 3 Bar o night club 4 Motel / hotel / hospedaje 5 Sala de masaje 6 Teléfono o Internet 7 Otros 8 Especifique _____ No contesta 98	
P1309	¿Usted tiene relaciones sexuales a cambio de dinero con....? LEER RESPUESTAS PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA	SI NO Hombres 1 2 Mujeres 1 2	

P1310	¿Cuántos clientes tuvo el último día que realizó trabajo sexual?	Número de clientes [][] No contesta 999	
P1311	Por lo regular, ¿cuántos clientes atiende en una semana?	Número de clientes [][] No contesta 999	
P1312	¿Aproximadamente cuánto dinero recibe por el pago de sus clientes a la semana?	Dólares americanos [][][][] No recibe dinero 00,000 No contesta 99,999	
P1313	La última vez que tuvo relaciones sexuales con un cliente, ¿usaron condón? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No contesta 98	→ P1315 → P1315
P1314	¿Quién propuso el uso del condón en esa ocasión? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Yo 1 El cliente 2 Decisión conjunta 3 No contesta 98	
P1315	¿Por qué no usaron un condón usted y su cliente esa vez? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA	SI NO a. El cliente me pago más 1 2 b. Creo que está sano 1 2 c. El cliente no quiso usar 1 2 d. Yo no quise usar 1 2 e. Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas 1 2 f. No tenía un condón en ese momento 1 2 g. Los condones son muy caros 1 2 h. Los condones no funcionan 1 2 i. Otra 1 2 j. Especifique_____ 1 2	
P1316	La última vez que uso condón con un cliente, ¿usaron el condón todo el tiempo de la penetración? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No uso condón con mis clientes 3 No contesta 98	
P1317	La última vez que tuvo relaciones sexuales con un cliente, ¿usaron lubricante durante la penetración? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Si 1 No 2 No uso lubricante con mis clientes 3 No contesta 98	
P1318	En términos generales, ¿con que frecuencia usa usted el condón en las relaciones sexuales con sus clientes? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Siempre 1 Algunas veces 2 Nunca 3 No contesta 98	
P1319	En términos generales, ¿con que frecuencia usa usted lubricante durante la penetración en las relaciones sexuales con sus clientes? ANOTE UNA RESPUESTA EN LA CASILLA	[][] Siempre 1 Algunas veces 2 Nunca 3 No contesta 98	

P1320	¿Usted deja de usar el condón con un cliente, cuando...		SI	NO
	LEER RESPUESTAS	a. ¿Consume drogas o alcohol?	1	2
	PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA	b. ¿Es un cliente fijo?	1	2
		c. ¿El cliente paga más?	1	2
		d. ¿El cliente insiste mucho?	1	2
		e. ¿Hace sexo oral?	1	2
		f. ¿Revisa al cliente y se ve sano?	1	2
		g. Otro Especifique_____	1	2

**Muchas gracias por su tiempo y la información brindada en esta encuesta.
Le recordamos que la información proporcionada se mantendrá confidencial.**